

หมูป่า

- ลักษณะ :** ความยาวลำตัวและหัว 135-150 ซม. หางยาว 20-30 ซม. น้ำหนัก 75-200 กิโลกรัม มีรูปร่างคล้ายหมูบ้าน แต่สูงกว่าและค่อนข้างแบนกว่า มีขนที่แผงคอยาวประมาณ 10 ซม. ซึ่งจะตั้งชันขึ้นเวลาต่อสู้หรือตกใจ ผิวหนังมีสีเทาอ่อนข้างดำ หมูป่าตัวผู้มีเขี้ยวงอกยาว ออกมานอกริมฝีปาก ลูกหมูป่าที่เกิดใหม่มีจุดและลายตามลำตัวคล้ายกับผลแตงไทย แต่เมื่อโตขึ้นลายนี้จะจางหายไป
- เขตแพร่กระจาย :** ทวีปยุโรป แอฟริกาเหนือ เอเชีย ในประเทศไทยมีอยู่ทุกภาค โดยเฉพาะมีชุกชุม ตามที่ชุ่มชื้นในป่าดงดิบและป่าที่ลุ่มทั่วไป
- ที่อยู่อาศัย :** พบทั้งในป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง ชอบอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำในป่า ในเขตป่าสะแกราช พบร่องรอยหมูป่าได้ทั้งในป่าดิบแล้งและป่าห้วยรอก
- อุปนิสัย :** ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง ๆ ละ 7-10 ตัว หมูป่าผสมพันธุ์ได้เกือบตลอดทั้งปี แต่ส่วนใหญ่เริ่มต้นในช่วงฤดูหนาว ตั้งท้องประมาณ 112-115 วัน ตกลูกครอกละ 3-12 ตัว หมูป่ากินอาหารได้หลายชนิด ใช้สันจมูกคุนดินตามที่ชื้นและไปทั่วป่า เพื่อเสาะหาอาหารพวกหัวพืช รากอ่อนของต้นไม้ ไม้ไผ่เดือนดิน ตัวหนอน ค้างคาว แมลงต่าง ๆ และซากสัตว์
- สถานภาพ :** พบมากในป่าสะแกราช
- Characteristics :** Head and body 135-150 cm; tail 20-30 cm; weight 75-200 kg. This wild relative of a domestic pig is taller and more flattened in body shape with a 10 cm. long mane which will erect up when in fight or frightened. Pelage is blackish grey. A male has well-developed upper canines which protruding outward from the lips. Piglets have pale spots and striped all over the body which will disappear when becoming older.
- Distribution :** Europe, North Africa and Asia. In this country it distributes in all parts, exceedingly common at moist areas in evergreen forest and swamp forest.
- Habitat :** Found living in both dry evergreen and dry dipterocarp forests, usually near water bodies. In Sakaerat forest, its tracks have been seen in the dry evergreen forest and lush grassy areas.
- Habit :** Keeps in herds of 7-10 individuals. They breed almost throughout the year, but the majority start breeding in cold season. The gestation period is 112-115 days. One litter annually with 3-12 young. Feeds on omnivorous diets including roots, tubers,

earthworms, larvae, pupae, insects, snakes and even carcasses; by digging with its muzzle in wet areas.

Status : Abundant in Sakaerat forest.



หมูป่า

(ชื่ออื่น : หมูเถื่อน)

Common Wild Pig, Wild Boar

Sus scrofa Linnaeus, 1758