

อันเล็ก

- ลักษณะ :** ความยาวลำตัวและหัว 15-26 ซม. หางยาว 6-7 ซม. น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม คล้ายหนูขนาดเล็ก มีขนอ่อนนุ่มสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลเทา ขนที่ท้องสีเข้มกว่าที่หลัง หน้าผากอาจมีขนสีขาวขึ้นแซม ฝ่าเท้าของอันเล็กจะเรียบ ซึ่งแตกต่างจากฝ่าเท้าของอันใหญ่และอันกลาง อันเล็กเป็นสัตว์ฟันแทะ จึงมีฟันหน้ายาวออกมาจากปาก 2 คู่ ซึ่งมีปลายแหลมคมแบบสิ่วหรือลิ้มใช้สำหรับการขุดดินและขบกัด
- เขตแพร่กระจาย :** เนปาล อัสมัม เมียนมาร์ ในประเทศไทยมีอยู่เฉพาะบริเวณป่าเหนือคอคอดกระ
- ที่อยู่อาศัย :** ชอบขุดโพรงอยู่ใต้ผิวดินในบริเวณพื้นที่ภูเขาและมีไม้ไผ่ขึ้นอยู่ค่อนข้างหนาแน่น โพรงที่ขุดมักอยู่ใกล้ลำธาร ใต้กอไผ่ หรือโคนต้นไม้ใหญ่ บริเวณปากโพรงจะใช้กองดินปิดไว้กรที่จจะรู้ว่าอันเล็กทำรังอยู่บริเวณใด ให้สังเกตมูลดินที่ขุดขึ้นมากองไว้ ในป่าสะแกราชพบมากตามป่าเต็งรัง เช่นบริเวณเขาหินเพลิงและเขาคันนา
- อุปนิสัย :** อันเล็กจะขึ้นมาหาอาหารในตอนพลบค่ำหรือเช้ามืด อาหารที่ชอบกิน คือรากไผ่ หน่อไผ่ ลำต้นไผ่สดๆ และเหง้าเพ็กอ่อนในป่าสะแกราช รวมทั้งผลไม้ป่าต่างๆ ที่หล่นอยู่ตามพื้นป่า
- สถานภาพ :** มีชุกชุมในป่าสะแกราช
- Characteristics :** Head and body 15-26 cm; tail 6-7 cm; weight 0.5 kg. A small-sized subterranean rat with soft brown or grayish brown pelage, belly hairs darker than those of back. A small patch of white hairs present on forehead in some individuals. Its soles are quite smooth. Its long incisors are used for digging the ground, gnawing food items and biting enemies.
- Distribution :** Nepal, Assam, Myanmar, and Thailand where it distributes all over above the Isthmus of Kra.
- Habitat :** Normally constructing underground tunnel systems on hill slopes with dense clumps of bamboos, its preferred sites are always near the stream, under bamboo clumps or at base of large trees. The entrance is noticed by the presence of a heap of loose soil. In Sakaerat forest, they are confined to dry dipterocarp forest, such as Khao Hin Phloeng and Khao Kanna.

Habit : They will emerge from their burrows at dusk or at dawn searching for bamboo roots, bamboo shoots, living bamboo culms and young rhizomes of dwarf bamboos (in Sakaerat area), including many fallen fruits.

Status : Commonly found in Sakaerat area.



อ้นเล็ก

(ชื่ออื่น : ตุ่น)

Bay Bamboo Rat

Cannomys badius (Hodgson, 1841)