



ปาดจิวลายแต้ม, ปาดจิวศรีราชา  
*Chiromantis nongkhorensis* (Cochran, 1927)  
Mottle bush frog

## ปาดจิวลายแต้ม ปาดจิวศรีราชา – *Chiromantis nongkhorensis* (Cochran, 1927)

**ลักษณะ** มีขนาดตัวเล็ก (จากปลายปากถึงรูก้นประมาณ 30 – 40 มิลลิเมตร) ลำตัวยาว ผิวหนังลำตัวเรียบแต่มีตุ่มเล็กกระจายอยู่บ้าง โดยเฉพาะบนหัวและบริเวณส่วนต้นของขาหน้ากับขาหลัง

ลำตัวสีน้ำตาลแต่ตุ่มที่กระจายอยู่เป็นสีขาว มีแต้มสีเข้มรูปสามเหลี่ยมที่เปลือกตาบนและบนหัวทางด้านท้ายทอย บนหลังอาจมีปื้นสีดำพาดขวางหรือไม่มี ด้านท้องสีขาว คางสีขาวแต่มีจุดสีดำเล็กกระจาย

ขาหน้าค่อนข้างสั้นแต่ขาหลังค่อนข้างยาว เมื่อพับขาหลังแนบกับลำตัวไปทางด้านหน้า ข้อตื้นอยู่ในตำแหน่งประมาณกึ่งกลางของตา นิ้วตีนหน้ามีแผ่นหนังประมาณ 1/3 ของความยาวนิ้ว นิ้วตีนหลังมีแผ่นหนังประมาณ 3/4 ของความยาวนิ้ว ส่วนปลายของนิ้วทุกนิ้วขยายเป็นตุ่ม

ลูกอ๊อดมีขนาดตัวเล็ก หัวกว้างแต่ลำตัวเพรียว ตัวสีน้ำตาลอมเทาและมีจุดหรือปื้นสีเข้มกระจายทั่วลำตัว มีแถบสีเข้มพาดยาวจากส่วนปลายของปากถึงด้านหน้าตา ครีบกางโปร่งใสแต่มีจุดสีเข้มกระจาย ปากอยู่ทางด้านล่างค่อนข้างไปทางด้านหน้าของหัว ช่องปากใหญ่ ตุ่มฟันในอุ้งปากมีจำนวนแถวและลักษณะการเรียงตัวเป็นสูตร I:1+1/1+1:II จะงอยปากเล็ก ขอบของจะงอยปากมีรอยหยักทั้งจะงอยปากบนและจะงอยปากล่าง ลูกอ๊อดหากินอยู่ตามพื้นล่างของแอ่งน้ำ

**การแพร่กระจาย** เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา ในประเทศไทยพบทางตอนบนของภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชพบบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำ ลำห้วยบริเวณถ้ำจางออง และ....

**พื้นที่อาศัย** ใกล้เคียงลำห้วยน้ำไหลหรือแหล่งน้ำนิ่งที่มีกลุ่มไม้หรือพรรณพืชปกคลุมชายฝั่ง

**นิสัย** พบเห็นตัวเฉพาะฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงเวลาผสมพันธุ์ เกาะอยู่บนใบของพุ่มไม้หรือบนกิ่งของต้นไม้ที่เติบโตอยู่ชายอ่างเก็บน้ำและชายฝั่งลำห้วย และส่งเสียงร้อง (ติก ติก) ก้อนฟองไข่ติดกับใบไม้เหนือแหล่งน้ำ ลักษณะของก้อนฟองคล้ายปาดบ้านแต่มีขนาดก้อนฟองเล็กกว่าครึ่งหนึ่ง

**สถานภาพ** ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535 และไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์ของ Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2005) และตามเกณฑ์ของ IUCN (2008)