



ปาดตะปุ่มจันทบุรี

Theloderma stellatum Taylor, 1962

Chantaburi warted tree frog

ปาดตะปุมจันทบุรี – *Theloderma stellatum* Taylor, 1962

ลักษณะ มีขนาดตัวเล็ก (จากปลายปากถึงรูกันประมาณ 35 มิลลิเมตร) ลำตัวยาว ผิวหนังลำตัวรวมทั้งส่วนต้นของขาหน้าและของขาหลังมีตุ่มเล็กและใหญ่กระจายปะปนกันหนาแน่น ตุ่มที่ใหญ่มีส่วนยอดเป็นสีขาว ผิวลำตัวด้านท้องและด้านในทางส่วนต้นของขาหลังมีตุ่มแบนกระจาย

ด้านหลังสีน้ำตาลดำ บนหัวมีแต้มสีดำอยู่เกือบจะตรงปลายของส่วนหัวกับตรงกลางของหัวระหว่างตาทั้งสองข้าง บริเวณหัวไหล่มีแถบสีน้ำตาลเหลืองอมส้มค่อนข้างกว้างพาดขวาง ขอบด้านบนของแถบค่อนข้างตรง ขอบด้านล่างของแถบมีขอบเป็นสีขาวและตัวขอบเป็นรอยหยักหลายหยัก บริเวณกลางหลังมีปื้นสีดำใหญ่กระจาย ส่วนท้ายสุดของด้านหลังสีขาว ด้านข้างลำตัวจากส่วนปลายของหัวถึงด้านท้ายของขาหน้าเป็นสีน้ำตาลเหมือนบนหลัง ต่อด้วยปื้นสีขาวและปื้นสีดำตามลำดับ ด้านท้องและด้านในทางส่วนต้นของขาหลังสีครีมแต่มีจุดสีเข้มกระจาย คางสีม่วงและมีจุดสีขาวกระจาย ขาหน้าและขาหลังรวมทั้งนิ้วตีนมีทางสีเข้มกับสีครีมพาดขวางเป็นปล้อง

ขาหน้าสั้นแต่ขาหลังยาว เมื่อพับขาหลังแนบกับลำตัวไปทางด้านหน้า ข้อตีนอยู่ในตำแหน่งส่วนปลายของปาก นิ้วตีนหน้ามีแผ่นหนังประมาณ 1/3 ของความยาวนิ้ว นิ้วตีนหลังมีแผ่นหนังเกือบเต็มความยาวนิ้ว ส่วนปลายของนิ้วทุกนิ้วขยายเป็นตุ่มใหญ่มาก ตัวตุ่มมีความกว้างมากกว่าความยาว

การแพร่กระจาย เวียดนาม กัมพูชา ในประเทศไทยพบเฉพาะภาคตะวันออกและบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ต่อเนื่องกับภาคตะวันออก ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชพบในป่าดิบแล้ง

พื้นที่อาศัย พื้นที่ป่าที่มีความชุ่มชื้นและมีกลุ่มไม้หนาแน่น

นิสัย หลบซ่อนตัวในเวลากลางวันและออกหากินเวลากลางคืน อาศัยในพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งน้ำได้ดี พบเกาะอยู่ที่ลำต้นของต้นไม้ในระดับต่ำในป่าดิบแล้ง (หลักแดง) ไม่มีข้อมูลการผสมพันธุ์และวางไข่ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช แต่การศึกษาของ โกวิท น้อยโคตร (2545) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ อธิบายว่า ผสมพันธุ์และวางไข่ในเดือนพฤศจิกายนกับในเดือนมีนาคม เพราะพบลูกอ๊อดในช่วงเวลา 2 เดือนนี้ในโพรงของต้นไม้ในป่าบนภูเขา โพรงอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 100 เซนติเมตร น้ำในโพรงลึกประมาณ 10 เซนติเมตร น้ำขุ่นและมีตะกอนหนาแน่นรวมทั้งมีแมลงน้ำหลายชนิดอาศัยอยู่ ลูกอ๊อดมีหัวและลำตัวสั้นแต่กว้าง ตาใหญ่และอยู่ทางด้านบนของหัว ลำตัวสีเทาเข้มหรือสีดำตลอดทั้งตัว ด้านท้องสีจางกว่าด้านหลังเล็กน้อย ปากอยู่ที่ส่วนหน้าของหัว ช่องปากใหญ่ ตุ่มฟันในอุ้งปากมีจำนวนแถวและลักษณะการเรียงตัวเป็นสูตร I:3+3/III จะงอยปากใหญ่มาก ขอบของจะงอยปากมีรอยหยักทั้งจะงอยปากบนและจะงอยปากล่าง

สถานภาพ ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535 สำหรับสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ เป็นสัตว์ป่าถูกคุกคามในระดับมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) ตามเกณฑ์ของ Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2005) และเป็นสัตว์ป่าใกล้ถูกคุกคามตามเกณฑ์ของ IUCN (2008)

