

เหยี่ยวกิ่งก่าสีดำ

- ลักษณะ :** เป็นเหยี่ยวขนาดกลางสีดำขาว ลำตัวยาว 33 ซม. หัวและหงอนสีดำ หงอนยาวมักตั้งตรงได้คอสีดำตัดกับแถบสีขาวบริเวณอก ใต้ท้องมีลายแถบสีขาวสลับสีน้ำตาล หางสีดำ ขณะบินเห็นปีกกว้าง ปลายปีกมน ด้านใต้ปีกมีขนคลุมปีกสีดำ ปลายปีกขลิบดำ และได้โคนหางสีดำ ทั้งสองเพศมีลักษณะคล้ายกัน
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดียตอนใต้ ทางตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย จีนตอนใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเกาะไหหลำ
- ที่อยู่อาศัย :** หุบโล่ง ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่าร่วน จากพื้นราบจนถึงระดับความสูง 1,500 ม. ในป่าสะแกราช พบในป่าเต็งรังบริเวณเขาพะยอม
- อุปนิสัย :** ขณะอพยพเห็นเป็นฝูงใหญ่ 30 - 35 ตัว สังเกตในพื้นที่ในเดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน ช่วงบินอพยพผ่านไปสู่อุทิศได้ และช่วงบินกลับในเดือนมีนาคมและเมษายน อาหารส่วนใหญ่ได้แก่ แมลงต่าง ๆ โดยเฉพาะแมลงปีกแข็ง แมลงขนาดใหญ่ โดยบินโฉบจับบริเวณยอดไม้ หรือบินโฉบจับใกล้พื้นดิน บางครั้งจิกกินแมลงที่เกาะตามใบไม้
- สถานภาพ :** มีทั้งที่เป็นนกประจำถิ่น และนกอพยพมายังประเทศไทยในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
- Characteristics :** Size 33 cm. A medium-sized black-and-white hawk with distinctive long black erectile crest; lack of black contrasting strongly with white breast band; belly white banded with brown; tail wholly black. In overhead flight, it can be recognized by its wide rounded wings, black wing coverts and wing tips, and black under tail coverts. Both sexes are alike in appearance.
- Distribution :** Southern India, eastern Himalayas, to southern China, Southeast Asia and Hainan.
- Habitat :** Open ground, dry dipterocarp forest, dry evergreen forest, secondary growths, from the plain to the 1,500 m altitude. In Sakaerat forest, it keeps to the dry dipterocarp forest at Khao Payom.
- Habit :** Seen here, during September to November, migrating southwards in large flocks of 30-35 individuals, and also during its northerly migration between March and April. Its main diets include various insects; especially large beetles caught among the canopy or close to the ground, sometimes observed gleaning insects from the foliage.

Status : Occurring in this country both as residents and non-breeding migrants. Protected legally as a protected wild animal.



เหยี่ยวกิ่งดำ

Black Baza

Aviceda leuphotes (Dumont, 1820)