

## เหยี่ยวนกเขาชिकรา

- ลักษณะ :** ลำตัวยาว 30-36 ซม. นกตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้เล็กน้อย ขนด้านหลังสีน้ำตาลอมเทา แต่ในตัวผู้หลังเป็นสีเทา ขนด้านล่างลำตัวเป็นสีขาว มีลายขวางเล็ก ๆ สีน้ำตาลแดง คางสีขาว
- เขตแพร่กระจาย :** ทวีปแอฟริกา เอเชียตอนใต้ จีนตอนใต้ ไต้หวัน หมู่เกาะนิโคบาร์ สุมาตรา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบได้ทั่วไป ยกเว้นตอนใต้สุดของประเทศ
- ที่อยู่อาศัย :** ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าร่วน
- อุปนิสัย :** ชอบเกาะอยู่ตามกิ่งไม้สูงเด่น บางครั้งจะบินร่อนในช่วงสั้น ๆ พุ่งลงไปจับเหยื่อได้อย่างรวดเร็ว กินแมลง สัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก เช่น นก หนู และสัตว์เลื้อยคลาน ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม วางไข่ครั้งละ 3-5 ฟอง ใช้เวลาฟักไข่ 18-21 วัน
- สถานภาพ :** มีทั้งนกประจำถิ่น และนกอพยพ พบไม่บ่อยนัก ส่วนใหญ่พบในป่าเต็งรัง ครั้งละ 1 ตัว
- Characteristics :** Size 30-36 cm. Female a little larger than the male, has grayish brown back, whereas it is grey in the male; whitish under part with fine reddish brown barrings. Chin white.
- Distribution :** Africa, South Asia, Southern China, Hainan, the Nicobars, through SE Asia to Sumatra. In Thailand, widely spread except in the southernmost provinces.
- Habitat :** Dry evergreen forest, dipterocarp forest and secondary growth.
- Habit :** Prefers exposed perches. Sometimes seen soaring for a short distances, before plunging swiftly to seize preys. Diet comprises large insects, small vertebrates, such as birds, rodents and reptiles. Breeding between March-May, when a clutch of 3-5 eggs will be deposited. The incubation period is 18-21 days.
- Status :** Being uncommon, both as a resident and a seasonal migrant. Mostly found singly in the dipterocarp forest.



## เหยี่ยวนกเขาชिकรา

(ชื่ออื่น: เหยี่ยวนกเขา)

**Shikra**

*Accipiter badius*