

 Naew Na Circulation : 900,000 Ad Rate : 900	Section : กีฬา วันที่ : อาทิตย์ 08 กันยายน 2562 ปีที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 5 Col.Inch : 33 Ad Value : 29,700 PR Value(X3) : 89,100 คลิป : ขาวดำ
---	---



โรคลมแดด หรือ HEAT STROKE ที่มาพร้อมกับอากาศร้อนๆ ในประเทศไทยนั้นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อคนแล้ว เจ้าสัตว์เลี้ยงของเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วย อีกด้วย ถ้า สภาวะชื้อก้มเมื่อว่างกายของสุนัขมีอุณหภูมิสูงถึง 41-42 องศา สุนัขจะเริ่มเหื่อออกสูญเสียการควบคุมร่างกาย ไม่ค่อยรู้สึกตัว ชัก กล้ามเนื้อสั่น โอน่า เกิดผลกระทบต่อหัวใจ สมอง ตับ และเริ่มมีอาการได้หาย เกล็ดเลือดตัว มีจุดหรือจ้ำเลือดออก ปัสสาวะ อุจจาระและอาเจียนเป็นเลือด มีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต

อันที่จริงแล้วนั้นการระนาบความร้อนของสุนัขมีความแตกต่างกับมนุษย์เนื่องจากสุนัขนั้นมีต่อมเหื่ออยู่ โดยอยู่แค่บริเวณฝ่าเท้าเท่านั้น โดยทั่วไปแล้วจะระนาบความร้อนผ่านทางการหายใจ เมื่ออากาศร้อนมากๆ ดีมาน้ำอ้อยหรืออุ่นริเวณอากาศไม่ถ่ายเทจะทำให้เกิดภาวะอีกส์โดยตรงได้ วิธีป้องกันเพื่อลดภาวะอีกส์โดยตรงที่อาจเกิดกับสุนัขของท่านนั้นสามารถทำได้โดยหลีกเลี่ยงให้สุนัขแพะชิญแสงแดดเป็นเวลานาน ให้สุนัขอาศัยอยู่บริเวณที่อากาศถ่ายเทและไม่อบอ้าว เตรียมน้ำดื่มสำหรับสุนัขให้เพียงพอ และหากสังเกตเห็นว่าสุนัขเริ่มระนาบความร้อนไม่ทัน ให้หาหน้าให้สุนัขค่อยๆ ดื่มน้ำอ้อย และห้ามอา

ผ้าชุบน้ำเย็นมากลุ่มด้วยสุนัขเพราจะทำให้ระนาบหายเหงื่อไม่ได้ ที่สำคัญห้ามน้ำสุนัขไปแช่น้ำเย็นเดขาด เพราะอาจทำให้เกิดอาการช็อกได้ ทั้งนี้ หากสุนัขมีอาการเริ่มต้นที่สงสัยว่าอาจเกิดภาวะอีกส์โดยตรงควรรีบนำไปพบสัตวแพทย์ เนื่องจากการวิจัยปัจจัยทางชีวภาพการเกิดภาวะอีกส์โดยตรงในสัตว์หนึ่งในนั้นนี้ โปรตีนที่เกี่ยวข้องคือ Heat shock protein(HSPs) เมื่อมีการหักน้ำให้เกิดการผลิตโปรตีนชนิดนี้ ทำให้พบอัตราการลดตายจากภาวะอีกส์โดยตรงที่ต่ำ และพบว่าในกลุ่มที่รอดชีวิตนั้นมีการ recover ของโปรตีน Serum HSP72 (eHSP72) เร็วภายใน 24 ชั่วโมงไปต่อกันนี้จึงสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (biomarker) ของสัตว์เลี้ยงสูงด้วยนั้น รวมทั้งในมนุษย์ด้วย

