

Newspaper : Naew Na	Date: 31 August 2014
'HEADLINE' : นกกระจิบหน้าอกเทา	Page: 6
Section : กีฬา	Column Inch : 39
Circulation : 100,000	PR Value : 87,750

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วิทยาศาสตร์

สำหรับเยาวชน



นกกระจิบหน้าอกเทา

นกกระจิบหน้าอกเทา Grey-breasted Prinia มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า *Prinia hodgsonii* เป็นนกประจำถิ่นที่มีขนาดเล็ก พบได้บ่อยทั่วทุกภาค ยกเว้นทางภาคใต้ ตั้งแต่ที่ราบจนถึงระดับความสูง 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล อาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้า ป่าโปร่ง ป่าละเมาะ ป่ารุ่น และป่าริมทางเดิน มีการกระจายพันธุ์ในแถบอินเดีย ไปจนถึงประเทศจีนทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ พม่า ไทย ลาว เวียดนามและกัมพูชา

นกกระจิบหน้าอกเทา มีขนาดความยาววัดจากปลายปากจรดปลายหางยาวประมาณ 12 ซม. ลักษณะส่วนใหญ่คล้ายนกกระจิบหน้าอกสีเรียบ หัวมีสีเทาอมน้ำตาล ที่หัวตามีเส้นสีขาวสั้นๆ คล้ายคิ้ว ปากเล็กปลายแหลม ลำตัวด้านบนสีออกน้ำตาล ได้คางถึงอกสีขาวออกเทา กันสีเหลืองนวล

หางยาว แต่ถ้าอยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ สีที่หัวเป็นสีน้ำตาลอมเทาเข้ม จะไม่มีคิ้ว โคนปากล่างและใต้คางสีขาว ที่บริเวณรอบอกมีแถบพาดขวางกว้างสีเทา ขาและนิ้วเท้าสีส้มอมชมพู ส่วนนกวัยอ่อนสีขนเหมือนนกที่โตเต็มวัยในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ เพียงแต่มีแต้มสีเหลืองจางๆ ที่ใต้ท้อง

โดยทั่วไปจะพบเห็นนกชนิดนี้อาศัยหากินรวมกันเป็นฝูงเล็กๆ ประมาณ 6-12 ตัว อยู่ตามทุ่งหญ้าที่ค่อนข้างแห้งแล้ง และตามป่าละเมาะข้างทาง มันมักจะขึ้นเกาะอยู่ตามกิ่งไม้แห้งหรือตามกอหญ้า และกระดกหางไปเรื่อย ๆ พร้อมกับส่งเสียงร้องดัง ชี..ชี.. ชี..ชี.. คอยมองหาเหยื่อที่เป็นพวกแมลงและตัวหนอน แต่ในบางครั้งมันจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้บางชนิดอีกด้วย

ช่วงฤดูผสมพันธุ์จะอยู่ในราวเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม สร้างรังไว้ตามกอหญ้า สูงจากพื้นดินประมาณ 50 ซม. โดยการนำเอาใบไม้หรือใบหญ้ามาเย็บติดกันด้วยใยแมงมุม ทำเป็นรูปถ้วยตื้นๆ วางไข่ครั้งละ 3-4 ฟอง นกทั้งสองเพศจะช่วยกันฟักไข่อยู่นานราว 11-12 วัน เมื่อลูกนกออกจากไข่แล้ว ทั้งพ่อและแม่จะช่วยกันเลี้ยงดูลูกอ่อนอีกประมาณ 12 วัน จนลูกนกเติบโตและแข็งแรงดี จึงออกหัดบินจนคล่องแคล่ว แล้วจึงบินจากกอพ่อแม่ทิ้งรังไปสร้างชีวิตครอบครัวใหม่ตามลำพังต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อยังมีนกจำพวกชอบฝากเลี้ยงอย่างเจ้านกอีวาบดักแตนหรือเจ้าคักอุขนาดเล็ก ที่แอบมาไข่ไว้ในรังของนกกระจิบหน้าอกอยู่อย่างสม่ำเสมอ เจ้ากระจิบหน้าอกเทาชนิดนี้ก็ยังต้องเป็นนกอุปถัมภ์ค้าเลี้ยงดูลูกนกชนิดอื่นๆ อีกด้วยเช่นกัน

บุญจพร ศรีบุญช่วย

ฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)