

นกอีวาบตึกเตน

นกอีวาบตึกเตน (plaintive cuckoo : *Cacomantis merulinus*) อยู่ในวงศ์นกคัตคู (Family cuculidae) ซึ่งในประเทศไทยมี 24 ชนิด

นกอีวาบตึกเตน มีขนาดตัวประมาณ 21-23 ซม. มีอยู่ทั่วไปในประเทศไทย มักเกาะบนกิ่งไม้โล่งๆ สีลันของตัวนกเต็มวัยทั้งตัวผู้และตัวเมีย มีหัวสีเทา ลำตัว ปีกและหางสีเทาเข้มหน้าอกและท้องจะเป็นสีน้ำตาลแดง ใต้หางเป็นบั้งสีเทาเข้มหน้าอกและท้องจะเป็นสีน้ำตาลแดง ใต้หางเป็นบั้งสีขาว โดยทั่วไปนกตัวผู้มีสีเข้มกว่านกตัวเมีย

นกอีวาบตึกเตน เป็นนกที่ไม่ค่อยปราดเปรียว มักเกาะนิ่งๆ อยู่ตามกิ่งไม้ริมบึงน้ำหรือดงไม้รกๆ จะจับคู่ผสมพันธุ์ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม มักส่งเสียงร้องดังก้องกังวานและร้องบ่อยครั้งเพื่อประกาศอาณาเขตและร้องเรียกตัวเมีย

นกอีวาบตึกเตนไม่สร้าง



รังวางไข่ แต่จะวางไข่ในรังของนกกระเจิบธรรมดา เมื่อแม่นกกระเจิบธรรมดาเพลอ นกอีวาบตึกเตนจะแอบมาเชียวไข่ของนกกระเจิบธรรมดาให้ตกจากรังแล้ววางไข่แทนจนเหลือแต่ไข่ของมัน ในบางครั้งอาจจะมีนกกาเหว่ามาผสมโรงวางไข่ร่วมในรังนกกระเจิบธรรมดาอีกด้วย... ไม่ใช่เพียงแค่นกกระเจิบธรรมดาเท่านั้น ที่ต้องคอยเลี้ยงลูกนกอีวาบตึกเตน แต่หากยังมีนกชนิดอื่นอีกนกอีวาบตึกเตนมักแอบไปวางไข่ในรัง เช่นนกขมิ้นน้อยธรรมดา เป็นต้น

นกอีวาบตึกเตนเป็นนกที่กินตัวหนอนและแมลงเป็นอาหาร ซึ่งจะทำประโยชน์ให้กับเกษตรกร โดยการช่วยลดปริมาณศัตรูพืชจำพวกหนอน และบั้งที่เป็นอาหารโปรดของมัน โดยจะโฉบลงมาจับตัวบั้ง หนอนแก้ว แล้วคาบไปชูตกับกิ่งไม้ให้หนอนหลุด ซึ่งนกชนิดอื่นๆ จะไม่กินตัวบั้งเพราะมีขนเยอะ การที่นกอีวาบตึกเตนและนกกระเจิบธรรมดามีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งในเชิงนิเวศ เราจึงพบเห็นนกกระเจิบธรรมดาในบริเวณเดียวกันกับนกอีวาบตึกเตนเสมอ