

## ค้างคาวมงกุฎเล็ก

- ลักษณะ :** ความยาวลำตัวและหัว 3.8-4.2 ซม. หางยาว 1.6-2 ซม. ปลายแขนยาว 3.6-4 ซม. เป็นค้างคาวมงกุฎที่มีขนาดเล็กที่สุด ขนด้านหลังสีน้ำตาล ด้านท้องสีจางกว่า มีแผ่นจมูกส่วนหน้า (anterior noseleaf) กว้าง รูปร่างคล้ายเกือกม้า แผ่นจมูกส่วนหลัง (lancet) ยาวแหลม มีปุ่มจมูก (connecting process) แยกเป็น 2 แฉกปลายแหลม ใบหูใหญ่ ไม่มีติ่งหู (tragus) มีหางค่อนข้างยาวอยู่กลางแผ่นหางที่ซึ่งระหว่างขาหลังทั้งสอง
- เขตแพร่กระจาย :** จีนตอนใต้ อินเดียตะวันออกเฉียง พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ มาเลเซีย
- ที่อยู่อาศัย :** ตามถ้ำ ในโพรงไม้ หรือตามซอกหิน ในป่าสะแกราชจับได้ที่ชายป่าดิบแล้ง
- อุปนิสัย :** อาศัยตามหลืบถ้ำทั่วไป มักพบอยู่ร่วมกับค้างคาวมงกุฎ (*Rhinolophus* spp.) อื่นๆ 2-3 ชนิด ออกหากินเวลาพลบค่ำ กินแมลงเป็นอาหาร เช่น มด ตั๊กแตน แมลงวัน ค้างคาวปีกแข็ง ระยะตั้งท้อง 49 วัน ตกลูกครั้งละ 1 ตัว ค้างคาวชนิดนี้มีอายุยืนราว 6-7 ปี
- สถานภาพ :** พบไม่บ่อยนักในป่าสะแกราช กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



คางคาวมงกุฎเล็ก

**Least Horseshoe Bat**

*Rhinolophus pusillus* (Temminck, 1834)

Rhinolophidae

Chiroptera