

กระรอกปลายหางดำ

- ลักษณะ :** ความยาวลำตัวและหัว 22 ซม. หางยาว 24 ซม. เป็นกระรอกขนาดกลาง ปกติขนด้านหลังมีสีน้ำตาลแกมเขียว และด้านหลังมีสีเทาเงิน หางยาวเท่าลำตัว หางเป็นพวงมีลายเป็นปล้องสีดำอ่อน ปลายหางสีดำ ในช่วงฤดูแล้ง สีขนด้านหลังเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำตาลแดง ตัวเมียมีเต้านม 2 คู่
- เขตแพร่กระจาย :** พม่า ไทย และมาเลเซีย
- ที่อยู่อาศัย :** พบทั้งในป่า ชายป่า ป่าที่ถูกแผ้วถาง พื้นที่เกษตรกรรม และตามสวนผลไม้ ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าดิบแล้งที่รกรกที่บริมลำธาร ใกล้กับเขื่อนและที่ริมลำห้วย แปะใกล้กับเพิงหินเขียว
- อุปนิสัย :** โดยทั่วไปพบอยู่บนต้นไม้ ลงมาหาอาหารตามพื้นดินเป็นครั้งคราว อาหารได้แก่ผลไม้ เช่น กระจับปี่ มะปอก นอกจากนี้กินใบไม้ ยอดไม้ และหนอนแมลง กระรอกชนิดนี้จะทำรังด้วยกิ่งไม้ ใบไม้ และวัสดุเส้นใย รังมีรูปร่างค่อนข้างกลม มีทางเข้าออกด้านข้าง ทำรังตามกิ่งของพุ่มไม้หรือคอบไม้ต้นเล็กๆ ที่สูงจากพื้นดิน พอควร ตกลูกครั้งละ 2-4 ตัว ในกรณีเลี้ยงพบว่าเมื่ออายุยืนยาวถึงเกือบ 10 ปี
- สถานภาพ :** พบน้อยในป่าสะแกราช



กระรอกปลายหางดำ

Grey-bellied Squirrel

Callosciurus caniceps (Gray, 1842)

Sciuridae

Rodentia