

หนุขนเสี้ยนดอย

- ลักษณะ :** ความยาวลำตัวและหัว 14.5 ซม. หางยาว 17.5 ซม. น้ำหนัก 75 กรัม หนุขนเสี้ยนดอยจะมีขนแข็งขึ้นแซมบนลำตัวทางด้านหลัง เมื่อเอามือลูบดูจะรู้สึกตำมือคล้ายๆหนาม เป็นหนุขนาคกลาง หางยาวกว่าลำตัว ขนด้านหลังสีน้ำตาลแดง ด้านท้องสีขาว ใบหนาด้านข้างและคอมีสีสด หางมีสองสีด้านบนสีดำ ด้านล่างสีขาว ตัวเมียมีเต้านม 4 คู่
- เขตแพร่กระจาย :** จีนตอนใต้ พม่า เวียดนาม เกาะสุมาตรา เกาะชวา เกาะบาหลี ไทยพบทั่วทุกภาค
- ที่อยู่อาศัย :** อาศัยอยู่ในป่าดิบแล้ง ป่าสน ป่าเบญจพรรณ ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าดิบแล้ง เช่น บริเวณใกล้เขื่อนเก็บน้ำ
- อุปนิสัย :** เชื่องช้า หากินในเวลากลางวัน กินแมลง และผลไม้ป่าเป็นอาหาร เช่น ลูกก่อ ลูกกระบก ลูกมะกอกเลื่อม และลูกมะพอก ระยะตั้งท้อง 28 วัน ออกลูกครั้งละ 4-6 ตัว
- สถานภาพ :** พบได้ไม่บ่อยนักในป่าสะแกราช



หนูขนเสี้ยนดอย

Chestnut Rat, Bonhote's Rat

Niviventer bukit (Bonhote, 1903)

Muridae

Rodentia