

เหยี่ยวกิ่งกำลีดำ

- ลักษณะ :** เป็นเหยี่ยวขนาดกลางสีดำขาว ลำตัวยาว 33 ซม. หัวและหงอนสีดำ หงอนยาวมักตั้งตรง ใต้คอสีดำตัดกับแถบสีขาวบริเวณอก ใต้ท้องมีลายแถบสีขาวสลับสีน้ำตาล หางสีดำ ขณะบินเห็นปีกกว้าง ปลายปีกมน ด้านใต้ปีกมีขนคลุมปีกสีดำ ปลายปีกขลิบดำ และใต้โคนหางสีดำ ทั้งสองเพศมีลักษณะคล้ายกัน
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดียตอนใต้ ทางตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย จีนตอนใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเกาะไต้หวัน
- ที่อยู่อาศัย :** ทุ่งโล่ง ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่าร่วน จากพื้นราบจนถึงระดับความสูง 1,500 ม. ในป่าสะแกราช พบในป่าเต็งรังบริเวณเขาพะยอม
- อุปนิสัย :** ขณะอพยพเห็นเป็นฝูงใหญ่ 30 - 35 ตัว สังเกตในพื้นที่ในเดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน ช่วงบินอพยพผ่านไปสู่อินโดนีเซีย และช่วงบินกลับในเดือนมีนาคมและเมษายน อาหารส่วนใหญ่ได้แก่ แมลงต่าง ๆ โดยเฉพาะแมลงปีกแข็ง แมลงขนาดใหญ่ โดยบินโฉบจับบริเวณยอดไม้ หรือบินโฉบจับใกล้พื้นดิน บางครั้งจิกกินแมลงที่เกาะตามใบไม้
- สถานภาพ :** มีทั้งที่เป็นนกประจำถิ่น และนกอพยพมายังประเทศไทยในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



เหยี่ยวกิ่งก่าสีดำ

Black Baza

Aviceda leuphotes (Dumont, 1820)

Accipitridae

Falconiforms