

ไก่ป่า

- ลักษณะ :** ขนาด 43 – 76 ซม. เป็นต้นตระกูลของไก่บ้าน ตัวผู้มีขนาดใหญ่และสีสวยกว่าตัวเมีย คือมีหงอนสีแดงตั้งตรง จักกรหงอนงามมาก ขนตามลำตัวเป็นสีดำเหลือบน้ำเงินเข้ม มีสร้อยคอและขนบนหลังสีเหลืองแดง มีหางกระสวย 2 คู่ ยืนยาวออกมามากกว่าหางเส้นอื่น ปลายหางโค้งเป็นวง ขาทั้ง 2 ข้างมีเดือยยาวและแหลมคม ใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้ ไก่ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย ลำตัวสีน้ำตาลเข้ม และมีสร้อยรอบคอสีทอง หงอนและเดือยมีขนาดเล็กมาก ไก่ป่าที่พบในเมืองไทยมี 2 ชนิดย่อย คือ ไก่ป่าตุ้มหูแดง (*Gallus gallus spadiceus*) และไก่ป่าตุ้มหูขาว (*Gallus gallus gallus*) ทั้ง 2 ชนิดมีลักษณะเหมือนกัน ต่างกันที่ไก่ตัวผู้มีตุ้มหูขาวและแดง
- เขตแพร่กระจาย :** ทวีปเอเชีย ไก่ป่าตุ้มหูแดงพบในประเทศจีน ลาว เมียนมาร์ และไทย ในประเทศไทยพบได้ทั่วไปยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนไก่ป่าตุ้มหูขาว ซึ่งพบได้ที่ป่าสะแกราชัน ยังพบได้ในประเทศกัมพูชา เวียดนาม ในประเทศไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ที่อยู่อาศัย :** ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าร่วน และทุ่งหญ้า ตั้งแต่ที่ราบจนถึงระดับความสูง 1800 ม.
- อุปนิสัย :** เดินหากินเป็นฝูงเล็ก ๆ ห่าง ๆ กันตามพื้นป่า ออกหากินตั้งแต่เช้าตรู่ ไก่ตัวผู้จะส่งเสียงขันเจื้อยแจ้ว เพื่อประกาศอาณาเขตถิ่นที่อยู่และแหล่งหากิน ไม่ให้ใครล่วงล้ำเข้ามาและเพื่อเป็นสื่อถึงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ กินแมลง เมล็ดพืช ผลไม้สุก ดอกหญ้า แต่ที่ชอบมากที่สุดคือขุยไผ่ ซึ่งจะมีมากในช่วงฤดูร้อน และเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ ฤดูผสมพันธุ์เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ทำรังอยู่บนพื้นดิน ตามกอหญ้า กอไผ่ โพรงไม้ วางไข่ครั้งละ 5 – 10 ฟอง ระยะเวลาฟักไข่ประมาณ 21 วัน
- สถานภาพ :** นกประจำถิ่น ไก่ป่าที่พบในป่าสะแกราชันเป็นไก่ป่าตุ้มหูขาว (*Gallus gallus gallus*) พบบ่อย แม้จะถูกล่าไปบ้าง ในบริเวณป่าสะแกราชัน ซึ่งไก่ป่าวางไข่ในหน้าร้อน ไข่ไก่จะถูกไฟป่าทำลายไปมาก
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



ไก่ป่า

(ชื่ออื่น : ไก่เถื่อน, ไก่แจ้)

Red Junglefowl

Gallus gallus (Linnaeus, 1758)

Phasianidae

Galliformes