

## นกคุ่มอีตใหญ่

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 17 ซม. ขาและนิ้วเท้ามีสีเหลือง จะงอยปากล่างมีสีเหลือง ตัวเมียใหญ่กว่าและมีสีสดใสเด่นกว่าตัวผู้ บริเวณคอด้านบนเป็นสีน้ำตาลแดง ลำตัวด้านบนสีน้ำตาล มีลายจุดสีน้ำตาลเข้ม อกสีน้ำตาลแกมสีเนื้อ ลำตัวด้านข้างและบริเวณปีกมีลายจุดสีดำ ขณะบินจะเห็นสีสันบนปีกตัดกันเด่นชัดมากกว่านกคุ่มอีตชนิดอื่น
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดีย ญี่ปุ่น จีนตอนใต้ เกาหลีใต้ เวียดนาม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาะสุมาตรา เกาะชวา หมู่เกาะซุนดาน้อย และฟิลิปปินส์
- ที่อยู่อาศัย :** พบตามทุ่งหญ้า ป่าละเมาะ และพื้นที่ป่าทั่วไปจากพื้นราบจนถึงระดับความสูง 1,800 ม. ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** พบอยู่โดดเดี่ยว เป็นคู่ หรือเป็นฝูงเล็ก ๆ หากินเวลากลางวัน หากินโดยการคุ้ยเขี่ยตามพื้นดิน อาหารได้แก่ เมล็ดหญ้า เมล็ดพืช ปลวก แมลง ตัวหนอน และสัตว์ขนาดเล็ก เมื่อมีศัตรูหรือสิ่งรบกวน มันจะหลบซ่อนตามกอหญ้า หากจวนตัวมันอาจบินหนี แต่ไปไม่ไกลและบินไม่สูงนัก
- ผสมพันธุ์ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ทำรังตามพื้นดินภายในซุ่มกอหญ้า โดยขุดดินเป็นแอ่งใช้หญ้ารองรัง วางไข่ครั้งละ 4 – 6 ฟอง ไข่มีรูปร่างค่อนข้างมน สีน้ำตาลมีลายจุดสีน้ำตาลเข้ม ตัวผู้ตัวเดียวที่ฟักไข่และเลี้ยงดูลูก
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช
- กฎหมายยังไม่จัดเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง



## นกกระทาตีนใหญ่

**Yellow-legged Buttonquail**

*Turnix tanki* (Blyth, 1843)

Turnicidae

Gruiformes