

## นกกระแตแต้แว๊ด

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 33 ซม. หัว คอ ใต้คอ และอกส่วนบนมีสีดำ ตัดกับด้านท้องสีขาว ส่วนด้านหลังสีน้ำตาล ปากแดงปลายปากสีดำ ขนคลุมหูสีขาวเห็นเด่นชัด และมีเหนียงสีแดงเหนือหัวตา ขายาวผอม มีสีเหลือง เวลาบินจะเห็นแถบสีขาวควั่นรอบคอ แยกหัวสีดำออกจากแผ่นหลังสีน้ำตาล หางขาวปลายดำ นกกระแตแต้แว๊ดมีนิ้วเท้า 3 นิ้ว ยื่นไปข้างหน้า ส่วนนิ้วหลังสั้นมาก และอยู่สูงกว่านิ้วเท้าหน้า ด้วยเหตุนี้จึงเกาะกิ่งไม้ไม่ได้ ได้แต่เดินและวิ่งไปบนพื้นดิน
- เขตแพร่กระจาย :** พบตั้งแต่บริเวณทะเลแคสเปียน อินเดียน จีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเกาะสุมาตรา
- ที่อยู่อาศัย :** พบอาศัยและหากินตามทุ่งนา ทุ่งหญ้า ป่าละเมาะและบริเวณโล่งเตียนกลางป่า และตามชายแหล่งน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ในป่าสะแกราชพบบริเวณทุ่งหญ้าผสมป่าเต็งรังด้านตะวันออกเฉียงเหนือของที่ทำการสถานี
- อุปนิสัย :** มักพบเป็นคู่หรือฝูงเล็ก ๆ นอกฤดูผสมพันธุ์อาจรวมกันเป็นฝูงใหญ่ถึง 30 ตัว มักเดินหากินตามพื้นดินโล่ง ๆ ทั้งพื้นแห้งและพื้นดินที่เฉอะแฉะ อาหารคือแมลง หนอนแมลง และไส้เดือนที่พบตามพื้นดินหรือใบกอหญ้า โดยใช้ปากสั้นแต่ค่อนข้างแข็งแรง จิกกินทันทีเมื่อพบเหยื่อ ออกหากินทั้งกลางวันและกลางคืน แต่ชอบออกหากินกลางคืนมากกว่า
- ผสมพันธุ์ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน มีการเกี้ยวพาราสี ด้วยการบินผาดโผนหลาย ๆ แบบ และเวลาบินไปมักร้องไปด้วย “แต แต แต้ว๊ด” ทำรังบริเวณพื้นดินโล่ง ๆ ใช้ปากขุดพื้นดินให้เป็นแอ่งเพื่อวางไข่ และกันมิให้ไข่กลิ้งไปที่อื่น วางไข่ครั้งละ 3 – 4 ฟอง ไข่มีรูปร่างคล้ายลูกข้าง มีสีน้ำตาลอ่อน มีจุดแต้มหรือแถบสีน้ำตาลกระจายทั่วฟอง พ่อแม่นกช่วยกันทำรังฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน เป็นนกที่ค่อนข้างระแวดระวังภัยมาก ระยะเวลาฟักไข่ประมาณ 28 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ประเทศไทยพบเพียง 1 ชนิดย่อย คือ *Vanellus indicus atronuchalis*  
กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกระแตแต้แว๊ด

(ชื่ออื่น : นกต้อยตีวิด)

**Red-wattled Lapwing**

*Vanellus indicus* (Boddaert, 1783)

Charadriidae

Charadriiformes