

## นกพิราบป่า

- ลักษณะ :** ขนาดลำตัวยาว 33 ซม. ลำตัวป้อม หัวเล็ก คอ หาง และขาสั้น ขนคลุมลำตัวหลากสี แต่ที่พบมากที่สุดมีสีเทาเข้ม หัว คอ และอกเป็นสีเทาแกมน้ำเงิน หลังและท้องสีเทา ปีกสีเทา มีลายแถบสีดำ หางสีเทา ปลายหางสีดำ ขนบริเวณคอเป็นสีเขียวเหลือง ขนคลุมปีกด้านล่างสีขาว ปากสีดำ ขาและนิ้วสีแดง นกพิราบป่าเป็นต้นตระกูลของนกพิราบที่เลี้ยงกันอยู่ในปัจจุบัน
- เขตแพร่กระจาย :** เป็นนกที่ถูกนำเข้ามาปล่อยให้อยู่อย่างธรรมชาติ หรือกึ่งธรรมชาติทั่วโลก รวมทั้งที่อินเดีย จีน และได้หวนด้วย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นนกที่นำเข้ามา พบได้ทั่วไป ยกเว้นมาเลเซีย และเวียดนาม
- ที่อยู่อาศัย :** อาศัยอยู่ในเมือง หมู่บ้าน หน้าผาหิน และพื้นที่เกษตรกรรม ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าเต็งรัง ใกล้ที่ทำกรสถานี ฯ
- อุปนิสัย :** มักพบเป็นฝูงบินได้ดี แข็งแรง และบินได้ไกลมาก หากินตามพื้นดิน อาหารได้แก่ เมล็ดพืช ธัญพืช ยอดอ่อนของพืช และผลไม้ต่าง ๆ
- ผสมพันธุ์เกือบตลอดทั้งปี แต่พบมากช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ทำรังแบบง่าย ๆ โดยใช้ใบหญ้า ขยะมูลฝอย และขนนกวางซ้อนกันในโพรงหรือหลืบหินตามแหล่งที่อยู่อาศัย วางไข่ครั้งละ 2 ฟอง ไข่เป็นรูปรี มีสีขาว พ่อแม่ช่วยกันสร้างรัง ฟักไข่ ระยะฟักไข่ 16 วัน พ่อแม่ช่วยกันเลี้ยงดูลูกนก โดยสักรอกน้ำนมออกมาป้อนลูกนก เมื่อลูกนกเติบโตพอประมาณ จึงนำอาหารอื่นมาเลี้ยง ประมาณ 1 เดือนหลังออกจากไข่ ลูกนกแยกไปหากินเอง พวกมันจะทิ้งรังไป
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช
- กฎหมาย ยังไม่ได้จัดเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง



## นกพิราบป่า

**Rock Pigeon, Rock Dove**

*Columba livia* Gmelin, 1789.

Columbidae

Columbiformes