

## นกเขาใหญ่

- ลักษณะ :** นกเขขนาดกลาง ลำตัวยาว 30 ซม. หัวสีเทา รอบคอด้านหลังมีแถบสีดำ มีจุดสีขาว บนแถบดำนี้เห็นเด่นชัด ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลมีลายขีดสีดำ หน้าอกและท้องตอนบน มีสีน้ำตาลอมแดง ขนคลุมใต้หางสีขาว เวลาบินหางยาวและแผ่ออกกว้าง ปลายหางสองข้างมีขลิบสีขาว จะงอยปากสีดำ ขาสีแดง
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดีย จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาะไหหลำ ไต้หวัน หมู่เกาะซุนดาใหญ่ หมู่เกาะซุนดาเล็ก เกาะปาลาวัน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
- ที่อยู่อาศัย :** ป่าละเมาะ ทุ่งโล่ง ป่าโปร่ง พื้นที่เกษตรกรรม และบริเวณรอบหมู่บ้าน จากที่ราบจนถึงระดับความสูง 1800 ม. ในป่าสะแกราช พบทั้งในป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และบริเวณป่าผสม
- อุปนิสัย :** พบเป็นคู่หรือฝูงเล็ก ๆ มักพบเกาะสายไฟฟ้าหรือสายโทรเลขสองข้างถนน หรือเกาะตามกิ่งไม้แห้ง หากินเวลากลางวัน กินเมล็ดธัญพืช เมล็ดของไม้ต้น แมลง และตัวหนอนตามพื้นถนนหรือพื้นดินทั่วไป นิยมนำมาเลี้ยงกันมาก เนื่องจากมีเสียงร้องหรือเสียงขันที่ไพเราะและก้องกังวาน “ครู – ครู – ครู” การร้องและการขันเป็นการประกาศอาณาเขตและดึงดูดเพศตรงข้ามเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์
- ผสมพันธุ์เดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม รังเป็นแบบง่าย ๆ รูปร่างคล้ายจาน โดยนำกิ่งไม้เล็ก ๆ และต้นหญ้ามาวางซ้อนกัน อาจสานหรือวางไข่วิไปมา ทำแอ่งตรงกลาง นำใบหญ้าไปไม่มารองรัง ไข่ครั้งละ 2 ฟอง ไข่มีสีขาว ทั้งพ่อแม่ช่วยกันสร้างรัง ฟักไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะฟักไข่ 14 – 15 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยนักในป่าสะแกราช
- กฎหมายจัดนกเขาใหญ่เป็นสัตว์ป่าอนุรักษ์ประเภท โดยไม่ได้รับการสงวนและคุ้มครอง



## นกเขาใหญ่

(ชื่ออื่น : นกเขาหลวง)

### Spotted Dove

*Streptopelia chinensis* (Scopoli, 1786)

Columbidae

Columbiformes