

นกเขาเขียว

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็ก 25 ซม. ลำตัวด้านบนมีสีเขียวเหลืองเป็นมัน ใบหน้าและลำตัวด้านล่างมีสีน้ำตาลอมแดง ปากและขาสีแดงสด ตะโพกสีดำ และแถบสีขาว 2 แถบ ตัวผู้มีสีสดใสมากกว่าตัวเมีย บนหัวมีสีเทาเงิน หน้าผากและคิ้วขาว กระหม่อมและท้ายทอยสีน้ำตาลอ่อน
- เขตแพร่กระจาย :** พบในอินเดีย จีนตอนใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาะไหหลำ ใต้หวัน หมู่เกาะอันดามัน หมู่เกาะนิโคบาร์ ฟิลิปปินส์ หมู่เกาะซุนดา และออสเตรเลีย
- ที่อยู่อาศัย :** อาศัยตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบ จากที่ราบไปจนถึงระดับความสูง 1500 ม. ในป่าสะแกราชพบทั้งในป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่าปลูก และบริเวณทุ่งหญ้าผสมป่าเต็งรัง ซึ่งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของที่ทำการสถานี ฯ
- อุปนิสัย :** มักพบตามทางเดินหรือบริเวณใกล้ลำธาร ในป่า โดยเฉพาะป่าที่ชื้นและร่มครึ้ม พบอยู่โดดเดี่ยวหรือเป็นคู่ อาหารได้แก่แมลงปีกแข็ง เมล็ดธัญพืช ผลไม้ที่ร่วงหล่นตามพื้นดิน บางครั้งก็จิกกินแมลงและปลวกตามพื้นดิน นกเขาเขียวบินได้เร็วและตรงในระดับที่ไม่สูงมากนัก บางครั้งพบเกาะตามกิ่งไม้ที่มีใบค่อนข้างแน่นทึบ
- ผสมพันธุ์ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน รังเป็นแบบง่าย ๆ โดยใช้กิ่งไม้เล็ก ๆ วางซ้อนกันตามง่ามหรือกิ่งไม้ อยู่สูงจากพื้นดิน 2 – 5 ม. วางไข่ครั้งละ 2 ฟอง ไข่มีสีเนื้อแกมสีครีม ระยะเวลาฟักไข่ราว 13 วัน พ่อแม่ช่วยกันทำรัง ฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยในป่าสะแกราช
กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกเขาเขียว

Emerald Dove, Green-winged Pigeon

Chalcophaps indica (Linnaeus, 1758)

Columbidae

Columbiformes