

## นกคัคคูเหี่ยวอกแดง

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็ก (29 ซม.) ลำตัวด้านบนสีเทา ใต้คอสีขาว อกและท้องส่วนหน้าสีน้ำตาลแดง ท้องส่วนท้ายและใต้โคนหางเป็นสีขาว หางเป็นลายบั้งสีน้ำตาลเข้มสลับเทา ปลายสุดเป็นสีน้ำตาลแดง
- เขตแพร่กระจาย :** เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาหลีเหนือ เวียดนาม ไทย มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม หมู่เกาะซุนดาใหญ่ เกาะสุลาเวซี และฟิลิปปินส์
- ที่อยู่อาศัย :** อาศัยอยู่ตามป่าดงดิบ และป่าเบญจพรรณ จากที่ราบจนถึงระดับความสูง 1100 ม. ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** พบหากินโดดเดี่ยวหรือเป็นคู่ เกาะตามกิ่งก้านของต้นไม้ที่มีใบหนาทึบ ทำให้มองเห็นตัวได้ยาก นอกจากได้ยินเสียงร้อง “กี – วิด” ติดต่อกัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์ มักร้องช่วงเช้าและเย็น อาหารได้แก่ แมลงและหนอนแมลงตามกิ่งไม้ เปลือกไม้ และยอดไม้ บางครั้งกินผลไม้เนื้ออ่อน เช่น ลูกไทร ลูกหว้า เป็นต้น
- การผสมพันธุ์ เป็นนกปรสิต จะไม่สร้างรังเอง แต่จะไปวางไข่ในรังนกอื่น เช่น นกจับแมลง และนกปีกลิ้น ซึ่งทำรัง วางไข่ ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ไข่มีสีน้ำตาลแกมเขียว เมื่อวางไข่แล้ว จะทิ้งให้นกเจ้าของรังฟักและเลี้ยงลูกอ่อนให้ โดยไม่สนใจไข่และลูกอ่อนของมันอีกเลย
- สถานภาพ :** เป็นทั้งนกประจำถิ่นและบางส่วนเป็นนกอพยพย้ายถิ่นมาช่วงฤดูหนาว พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ ชนิดย่อย *nisicolor*
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



## นกคั้คคูเหี้ยวอกแดง

**Hodgson 's Hawk-Cuckoo, Horsfield 's Hawk-cuckoo, Malayan Hawk Cuckoo,  
Fugitive Hawk Cuckoo.**

*Cuculus fugax* Horsfield, 1821

Cuculidae

Cuculiformes