

## อีวาบตั๊กแตน

- ลักษณะ :** นกขนาดเล็ก (22 ซม.) หัว ใต้คอ และอกส่วนบนมีสีเทา ส่วนบริเวณท้ายทอย ด้านหลังลำตัว และปีกมีสีน้ำตาลเทาเข้มกว่า อกตอนล่างและส่วนท้องมีสีเนื้อแกมน้ำตาล ทางสีดำ ทางด้านล่างมีลายขีดสีขาว นกที่ยังโตไม่เต็มวัย ลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลแกมแดง และมีลายสีน้ำตาลเข้มกระจายไปทั่วตัว ส่วนท้องสีขาวมีลายเล็ก ๆ สีดำ
- เขตแพร่กระจาย :** พบในอินเดียตะวันออก จีนตอนใต้ เกาะไหหลำ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะซุนดาใหญ่ ฟิลิปปินส์ และเกาะสุลาเวสี
- ที่อยู่อาศัย :** พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าละเมาะ สวนผลไม้ และบริเวณเกษตรกรรม จากพื้นราบจนถึงระดับความสูง 1800 ม. ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** มักพบเกาะตามกิ่งไม้ใหญ่ และไม้พุ่มที่มีใบหนาแน่น กินตัวหนอน และแมลงตามกิ่งไม้ และยอดไม้ บางครั้งบินโฉบแมลงกลางอากาศใกล้กับที่เกาะ หรือบินโฉบแมลงและตัวหนอนตามพื้นดิน เป็นนกปรสิตไม่สร้างรังและเลี้ยงลูกตนเอง วางไข่ในรังของนกอื่น เช่น นกกระจ้อย นกกระจิบหญ้า นกยอดข้าว และนกกระจิบเป็นต้น ฤดูผสมพันธุ์ของมันจึงขึ้นอยู่กับฤดูผสมพันธุ์ของนกเจ้าของรัง ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม ไข่มีสีคล้ายกับไข่ของนกเจ้าของรัง แต่ฟองใหญ่กว่า เมื่อวางไข่แล้ว จะปล่อยให้นกเจ้าของรัง ฟักไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อนให้ โดยไม่สนใจไข่หรือลูกอีกเลย
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช  
กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



## อีวาทักแตน

### Plaintive Cuckoo

*Cacomantis merulinus* (Scopoli, 1786)

Cuculidae

Cuculiformes