

นกตบยุงป่าโลก

- ลักษณะ :** เป็นนกตบยุงขนาดเล็ก ลำตัวยาว 25 ซม. มีสีส้มคล้ายนกตบยุงหางยาว แต่ลำตัวด้านบนของนกตบยุงป่าโลกมีลายที่เล็กละเอียดกว่า หางสั้นกว่า ตัวผู้ บริเวณปีกมีลายแถบสีขาว และขนหาง 2 คู่ นอกมีสีขาวตลอด ใต้คอสีขาวปกติมีรอยแบ่งตรงกลาง ตัวเมียขนหางด้านบนอก ไม่มีลายแถบสีขาว
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดีย จีนตอนใต้ ไต้หวัน เมียนมาร์ ไทย อินโดจีน หมู่เกาะซุนดา เกาะสุลาเวสี และฟิลิปปินส์
- ที่อยู่อาศัย :** อาศัยตามป่าเต็งรัง ป่าสน ป่าดงดิบเขา ป่าละเมาะ และทุ่งโล่ง จากพื้นราบจนถึงระดับความสูง 900 ม. ในป่าสะแกราชพบบริเวณที่โล่ง ทุ่งหญ้าผสมป่าเต็งรัง ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของที่ทำการสถานี ฯ
- อุปนิสัย :** พบโดดเดี่ยวหรือเป็นคู่ หากินช่วงเย็นค่ำ และกลางคืน บางครั้งพบบินเหนือแหล่งน้ำ แล้วทิ้งตัวตกลงไปกินน้ำ ลักษณะคล้ายนกนางแอ่น พฤติกรรมการกินอาหารและอุปนิสัยคล้ายกับนกตบยุงสกุลเดียวกัน
- ผสมพันธุ์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ทำรังบนพื้นดิน โดยขุดดินเป็นแอ่งเล็ก ๆ ได้ร่มเงาต้นไม้ วางไข่ครั้งละ 2 ฟอง ไข่รูปร่างรียาวมีสีชมพู และมีลายสีแดง พ่อแม่ช่วยกันฟักไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น มีชนิดย่อยเพียงชนิดย่อยเดียว ในประเทศไทย คือ *Caprimulgus affinis monticolus*
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกตบยุงป่าโคก

Savanna Nightjar

Caprimulgus affinis Horsfield, 1821

Caprimulgidae

Caprimulgiformes