

นกโพระดกกอสีฟ้า

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 23 ซม. ใบหน้าและใต้คอมีสีฟ้าสด หน้าผากและท้าย
กระหม่อมมีสีแดง เหนือตามีคิ้วเป็นแถบสีดำ ซึ่งเชื่อมกับแถบสีดำกลางกระหม่อม ปาก
ใหญ่ โคนปากสีเหลือง ปลายปากสีดำ ลำตัวอ่อนบวมสีเขียว หางสั้น
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดีย จีนตอนใต้ เมียนมาร์ ไทย ลาว และเวียดนาม
- ที่อยู่อาศัย :** อาศัยอยู่ตามป่าดงดิบ และป่าโปร่ง ตั้งแต่ระดับความสูง 600 –1800 ม. ในป่าสะแก
ราชพบได้ทั้งในป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** พบหากินอยู่บนเรือนยอดของต้นไม้ อาจพบเป็นฝูงบนต้นไม้ที่มีผลสุก กินผลไม้เป็น
อาหารหลัก โดยเฉพาะ ไทร หว้า ตะขบและไม้เถาบางชนิด นอกจากนี้อาจกินแมลง
และหนอนแมลง ช่วงฤดูผสมพันธุ์มักส่งเสียงร้องเกือบตลอดทั้งวัน และจะร้องบ่อยมาก
ช่วงเช้าและเย็น มักร้อง ตก-กะรึก-ตก-รึก ร้องเร็วเร็วมาก
- ผสมพันธุ์ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ทำรังโดยขุดเจาะโพรงตามกิ่งไม้
ใหญ่ หรือต้นไม้ที่ยืนต้นตายหรือไม้ผุหรืออาจใช้โพรงรังเก่าของนกหัวขวาน และมัก
ใช้โพรงเดิมเป็นประจำทุกปี ปกติไม่มีวัสดุรองรัง วางไข่ครั้งละ 3 – 4 ฟองไข่มีสีขาว รูป
ร่างค่อนข้างยาว พ่อแม่กันช่วยกันขุดเจาะรัง ฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะเวลาฟักไข่ 14
– 15 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกโพระดกคอสีฟ้า

Blue-throated Barbet

Megalaima asiatica (Latham, 1970)

Megalaimidae

Piciformes