

นกโพระดกคอสีฟ้าเคราดำ

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็ก (23 ซม.) ลำตัวสีเขียว ปากสีดำ กระจงอมสีเขียว ใบหน้าและคอสีฟ้าอมเขียว โคนปากด้านบน ท้ายทอยและข้างคอมีแต้มสีแดงเล็ก ๆ มีเส้นสีดำลากผ่านตา และข้างแก้ม ขาสีเทา ทั้งสองเพศมีลักษณะและสีสันทคล้ายกัน
- เขตแพร่กระจาย :** เป็นนกเฉพาะถิ่นที่พบในเมียนมาร์ ไทย กัมพูชา และเวียดนาม
- ที่อยู่อาศัย** อาศัยอยู่ตามป่าดงดิบ ตั้งแต่ระดับความสูง 600 – 1700 ม. ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าดิบแล้ง
- อุปนิสัย :** มักพบโดดเดี่ยวหรือเป็นคู่ บ่อยครั้งพบหากินบนต้นไม้ที่มีผลสุกปะปนกับนกโพระดกชนิดอื่น โดยหากินลูกไม้เป็นอาหารหลังจากนั้นจะเกาะร้องเสียงดังได้ยินไปไกล
- ผสมพันธุ์ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ชุดเจาะโพรงทำรังบนต้นไม้ที่ยืนต้นตาย และค่อนข้างฝู บางครั้งก็เจาะโพรงตามต้นไม้เนื่ออ่อนที่ยังมีชีวิต วางไข่ครั้งละ 3 – 4 ฟอง ไข่มีสีขาว พ่อแม่ช่วยกันฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะฟักไข่ 14 – 15 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ *Megalaima incognita euroa*
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกโพระดกคอสีฟ้าเคราดำ

Moustached Barbet, Hume's Blue-throated Barbet

Megalaima incognita Hume, 1874

Megalaimidae

Piciformes