

นกหัวขวานสีนํ้าหลังทอง

- ลักษณะ :** เป็นนกหัวขวานขนาดค่อนข้างใหญ่ ลำตัวยาว 33 ซม. ด้านหลังและปีกมีสีทองสดใส ตะโพกสีแดง ใบหน้ามีลายแถบสีขาวสลับดำ ลำตัวด้านล่างสีดำมีลายเกล็ดสีขาว หางสีดำ ตัวผู้มีหน้าผาก กระหม่อมและขนหงอนสีแดง ส่วนตัวเมียเป็นสีดำมีลายจุดสีขาว ลักษณะทั่วไปคล้ายนกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง ที่แตกต่างคือนกหัวขวานสีนํ้าหลังทอง มีปากยาวกว่า และหนากว่า มีนิ้วเท้า 4 นิ้ว และบริเวณใบหน้ามีเส้นสีดำสองเส้นลากจากมุมปากไปข้างคอ
- เขตแพร่กระจาย :** พบในอินเดีย จีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะซุนดาใหญ่ และฟิลิปปินส์
- ที่อยู่อาศัย :** อาศัยตามป่าโปร่ง ป่าดงดิบ และป่าชายเลน จากที่ราบไปจนถึงระดับความสูง 1200 ม. ในป่าสะแกราชพบทั้งบริเวณป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง
- อุปนิสัย :** มักพบเป็นคู่ หรือเป็นครอบครัว มีพฤติกรรมใช้ปากเคาะต้นไม้ให้เกิดเสียงกังวาน ได้ยินในระยะไกล ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ได้ยินเสียงเคาะบ่อยมาก เข้าใจว่าเป็นการประกาศอาณาเขต และดึงดูดเพศตรงข้าม อาหารส่วนใหญ่ ได้แก่ แมลง หนอนแมลง หากิน โดยเกาะกับลำต้นของกิ่งไม้ ใช้ปากเคาะหาเหยื่อได้เปลือกไม้ เมื่อพบใช้ลิ้นยาวตัววัดเหยื่อเข้าปาก บางครั้งพบกินน้ำหวานดอกไม้ด้วย โดยเฉพาะดอกทองหลวงป่า ดอกกาฝาก และดอกจิวป่า
- ผสมพันธุ์เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ทั้งสองเพศช่วยกันขุดเจาะโพรงทำรังตามต้นไม้ที่มีเนื้ออ่อนหรือแข็งปานกลาง โพรงอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 2-5 ม. และมักใช้โพรงเดิมเป็นประจำทุกปี วางไข่ครั้งละ 4-5 ฟอง ไข่มีสีขาว พ่อแม่กันช่วยกันฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะเวลาฟักไข่ 16 - 17 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ *Chrysocolaptes lucidus guttacristatus*
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง

Greater Flameback, Greater Goldenback, Four-toed Woodpecker

Chrysocolaptes lucidus (Scopoli, 1796)

Picidae

Piciformes