

นกหัวขวานเขียวป่าไผ่

- ลักษณะ :** เป็นนกหัวขวานขนาดกลาง ลำตัวยาว 30 ซม. ขนคลุมตัวด้านบน และปีกมีสีเขียว ตะโพกสีเขียวแกมเหลือง ขนบริเวณหุ้มีสีเทา แก้มมีแถบสีดำลายจุดขาว ใต้คอและอก ส่วนบนมีสีเหลือง อกส่วนล่างและท้องมีลายเกล็ดสีเขียวจาง ตัวผู้ บริเวณกระหม่อม และท้ายทอยมีสีแดง ส่วนตัวเมียเป็นสีดำ
- เขตแพร่กระจาย :** บังคลาเทศ เมียนมาร์ ไทย มาเลเซีย อินโดจีน เกาะสุมาตรา และ เกาะชวา
- ที่อยู่อาศัย :** พบได้ทั้งป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่ารุ่น ป่าละเมาะ จากที่ราบจนถึงระดับความสูง 1500 ม. บางครั้งพบในสวนผลไม้ ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าดิบแล้ง
- อุปนิสัย :** มักพบเป็นคู่เกาะตามลำต้นของต้นไม้ มันใช้ขนหางแข็งกดกับลำต้นคอยค้ำยัน ทำให้เกาะได้มั่นคง ใช้ปากเคาะต้นไม้เพื่อหาอาหาร กินแมลงและหนอนแมลงที่อยู่ในเนื้อไม้ ใช้ลิ้นซึ่งสามารถยืดยาวออกไปตามโพรงหรือรูของต้นไม้ หรือได้เปลือกไม้ แล้ว ตวัดเหยื่อเข้าปาก บางครั้งพบหากินมด ปลวก ตามพื้นดิน และอาจกินผลไม้หรือน้ำหวานดอกไม้บางชนิดด้วย
- ผสมพันธุ์ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ทำรังตามโพรงต้นไม้ โดยทั้งสองเพศช่วยกันใช้ปากขุดเจาะโพรง โดยเฉพาะต้นไม้เนื้ออ่อน และมักใช้โพรงเดิมทำรังในปีต่อไป ไข่มีสีขาว พ่อแม่ช่วยกันฟักไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะฟักไข่ 15-18 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบน้อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ *Picus vittatus euros*

กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกหัวขวานเขียวป่าไผ่

Laced Woodpecker, Laced Green Woodpecker, Bamboo Green Woodpecker

Picus vittatus Vieillot, 1818.

Picidae

Piciformes