

## นกหัวขวานสีน้ำตาล

- ลักษณะ :** เป็นนกหัวขวานขนาดเล็ก ลำตัวยาว 25 ซม. ขนปกคลุมลำตัวมีสีน้ำตาลแกมแดง และมีลายริ้วสีดำทั่วตัว หัวมีหงอนสั้น ๆ ปากแหลมสีดำค่อนข้างสั้น ตัวผู้มีแถบสีแดงที่แก้ม
- เขตแพร่กระจาย :** เทือกเขาหิมาลัย อินเดีย จีนตอนใต้ เกาะไหหลำ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหมู่เกาะซุนดาใหญ่
- ที่อยู่อาศัย :** พบทั้งในป่าดงดิบ ป่าโปร่ง และป่าละเมาะ จากที่ราบจนถึงระดับความสูง 900 ม. ในป่าสะแกราชพบบริเวณที่โล่งของทุ่งหญ้าผสมป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** มักพบเป็นคู่ หากินตามยอดไม้ ใช้ปากเคาะต้นไม้เช่นเดียวกับนกหัวขวานอื่น ๆ ชอบเกาะตามรังมด ให้มดมาไต่ตอมร่างกาย จากนั้นกระโดดไปยังกิ่งไม้ใกล้เคียง ใช้ปากจับมดกินเป็นอาหาร บางครั้งลงมาหากินตามจอมปลวก และขอนไม้ นอกจากนี้ยังกินผลไม้บางชนิด เช่น ลูกไทร และน้ำหวานดอกไม้ เช่น ดอกทองหลางป่า และดอกจี่ว
- ผสมพันธุ์ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ทำรังอยู่ตามรังมด บนต้นไม้ ใช้ปากเจาะด้านข้างของรังมด แล้วทำเป็นโพรงภายใน วางไข่ครั้งละ 2 – 3 ฟอง ไข่มีสีขาว พ่อแม่นกช่วยกันสร้างรัง ฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะฟักไข่ 14 – 15 วัน การที่มันทำรังในรังมดอาจเป็นเพราะต้องการใช้ไข่และตัวอ่อนของมดเป็นแหล่งอาหารสำหรับตัวเองและลูกนก โดยไม่ต้องไปหาอาหารที่อื่น
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบน้อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ *Ceelus brachyurus phaiiceps*
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกหัวขวานสีน้ำตาล

**Rufous Woodpecker**

*Celeus brachyurus* (Vieillot, 1818)

Picidae

Piciformes