

## นกหัวขวานใหญ่สีดำ

**ลักษณะ :** นกหัวขวานขนาดใหญ่ ลำตัวยาวประมาณ 43 ซม. ตัวผู้และตัวเมียต่างกันเล็กน้อย ขนตัวทั่วไปสีดำ ท้องขาว ชนิดย่อย *feddeni* มีสะโพกสีขาว ส่วนชนิดย่อย *javensis* มีสะโพกสีดำ นกตัวผู้มีหงอนสีแดง เริ่มจากหน้าผากถึงท้ายทอย นกตัวเมียหงอนสีแดง จะเริ่มจากกลางกระหม่อมถึงท้ายทอย ที่โคนปากของนกตัวผู้มีแถบสีแดง ในนกตัวเมียไม่มี

**เขตแพร่กระจาย :** พบในอินเดีย อันดามัน จีน เกาหลี ซุนดาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม ลาว เขมร เมียนมาร์ ในประเทศไทย ชนิดย่อย *feddeni* พบทุกภาคยกเว้นภาคกลาง ชนิดย่อย *javensis* พบเฉพาะภาคใต้

**ที่อยู่อาศัย :** อาศัยอยู่ตามป่าที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ ทั้งป่าโปร่ง ชายป่าดงดิบ ในระดับความสูงไม่เกิน 600 ม. ชนิดย่อย *javensis* พบตามป่าดงดิบต่ำ และป่าชายเลน

**อุปนิสัย :** ชอบอยู่ตัวเดียว หรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 3 – 4 ตัว ตามป่าดงดิบ และป่าโปร่ง ชอบเกาะอยู่ตามยอดไม้ เกาะต้นไม้ในลักษณะตัวตั้งขึ้น ใช้ปากพลิกเปลือกไม้ หรือเจาะต้นไม้หาแมลงกินเป็นอาหาร

ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ทำรังอยู่ในโพรงไม้ขนาดใหญ่ ฝังอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 8 – 16 ม. วางไข่ครั้งละ 2 – 3 ฟอง

**สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่นที่หายาก โดยเฉพาะชนิดย่อย *javensis* เนื่องจากที่อยู่อาศัยคือป่าดงดิบต่ำ และป่าชายเลน ได้ถูกทำลายลงไปมาก ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราชคือ *feddeni*

การที่มีนกหัวขวานขนาดใหญ่และหายากชนิดนี้อาศัยอยู่ เป็นเหมือนเครื่องหมายความสมบูรณ์ของป่าสะแกราชได้เป็นอย่างดี

กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกหัวขวานใหญ่สีดำ

**White-bellied Woodpecker**

*Dryocopus javensis* (Horsfield, 1821)

Picidae

Piciformes