

นกนางแอ่นตะโพกแดง

- ลักษณะ :** นกขนาดเล็ก ความยาวลำตัว 18 ซม. หางเว้าลึก แตกต่างจากนางแอ่นบ้านโดยบริเวณตะโพกเป็นสีน้ำตาลแกมแดง ไม่มีแถบสีเข้มที่อก ได้โคนหางสีดำ ตัดกับสีขาวครีมของลำตัวด้านล่าง ซึ่งมีลายขีดสีเข้มกระจายไปทั่ว ไม่มีสีขาวบริเวณขนหาง และปีกกว้างกว่านกนางแอ่นบ้าน
- เขตแพร่กระจาย :** แอฟริกา ยุโรป เอเชีย อินเดีย จีน ไต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะอันดามัน หมู่เกาะซุนดา และฟิลิปปินส์
- ที่อยู่อาศัย** บินหากินในอากาศเหนือท้องทุ่งและป่าดงดิบทั่วไป พบตั้งแต่พื้นราบจนถึงระดับความสูง 2,565 ม.
- อุปนิสัย :** มักพบเป็นฝูงบินฉวัดเฉวียน และโฉบจับแมลงกลางอากาศเกือบตลอดทั้งวัน บางครั้งบินรวมฝูงกับนกนางแอ่นชนิดอื่น ๆ เวลาพักผ่อนจะเกาะตามกิ่งไม้แห้ง สายไฟฟ้า ชะง่อนหิน หน้าผา
- ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม รังเป็นรูปทรงกระบอกติดกับเพดาน ผนังถ้ำ หรือชะง่อนหิน หรือตามสิ่งก่อสร้าง วัสดุที่ใช้ทำรังส่วนใหญ่เป็นดินโคลน แต่อาจใช้หญ้า ขนนก และมูลของตนเองมาผสมด้วย มักใช้รังเดิมในปีต่อไป วางไข่ครั้งละ 3 – 4 ฟอง ไข่สีขาว มีลายจุดและลายขีดสีน้ำตาลแดง พ่อแม่กันช่วยกันทำรัง ฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะฟักไข่ 14 – 15 วัน
- สถานภาพ :** เป็นทั้งนกประจำถิ่น และนกอพยพมาในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ประเทศไทยพบชนิดย่อยเดียว คือ *Hirundo daurica daurica*
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกนางแอ่นตะโพกแดง

Red-rumped Swallow

Hirundo daurica Linnaeus, 1771

Hirundinidae

Passeriformes