

นกปรอดทอง

- ลักษณะ :** มีขนาดความยาวลำตัว 18 ซม. มีหัวสีดำตัดกับสีเหลืองสดใสบริเวณท้อง และสีเหลืองอมเขียวบริเวณด้านหลังของลำตัว ขนปลายปีกและขนคลุมขนปลายปีกมีสีน้ำตาลดำ ปลายหางมีสีเหลือง และมีแถบดำคาดตอนใกล้ปลายหาง นกปรอดทองบางตัว (ซึ่งพบน้อยมาก) มีสีเทาบริเวณท้อง หน้าอก และบริเวณหลังคอ นกทั้ง 2 เพศมีลักษณะคล้ายกัน
- เขตแพร่กระจาย :** แคว้นอินโดจีน ปากีสถาน จีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ ฟิลิปปินส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบทุกภาค
- ที่อยู่อาศัย :** พบทั่วไปในป่าดิบแล้ง ป่าละเมาะ ป่าผลัดใบใกล้แหล่งน้ำ ในป่าสะแกราช พบบริเวณป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** พบหากินอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ ตามพุ่มเรือนยอด และกิ่งระดับกลางเป็นบริเวณกว้าง อาหารได้แก่ผลไม้สุก เช่น ลูกไทร หากินร่วมกับนกกินผลไม้อื่น ๆ นอกจากนั้นยังกินแมลง หนอน และแมงมุมอีกด้วย
- ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน ทำรังด้วยกิ่งไม้เล็ก ๆ ใบหญ้า ใบไม้แห้ง รังเป็นรูปถ้วยค่อนข้างใหญ่ รังไม่สูงจากพื้นดินมากนัก ทำรังตามง่ามไม้ของไม้พุ่ม หรือในป่าไผ่ วางไข่ครั้งละ 2 – 3 ฟอง
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยนักในป่าสะแกราช
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกปรอดทอง

Black- headed Bulbul

Pycnonotus atriceps (Temminck, 1822)

Pycnonotidae

Passeriformes