

นกปรอดสวน

- ลักษณะ :** ขนาดความยาวลำตัว 20 ซม. ขนปกคลุมลำตัวสีน้ำตาล ด้านท้องสีจางกว่า โดยทางด้านล่างมีสีเหลือง มีลายขีดสีขาวเล็ก ๆ เรียงถี่ ๆ บริเวณหู ตัวผู้มีตาสีเทา ตัวเมียตาสีน้ำตาลอ่อน
- เขตแพร่กระจาย :** เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นมาเลเซียตอนใต้ เมียนมาร์ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ และเวียดนามตอนเหนือ
- ที่อยู่อาศัย :** พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าละเมาะ สวนผลไม้ บริเวณเกษตรกรรม เป็นนกปรอดที่พบบ่อยที่สุดตามแหล่งชุมชน ในป่าสะแกราช พบบริเวณทุ่งหญ้าผสมป่าปลูกซึ่งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของสถานี ฯ
- อุปนิสัย :** มักพบเป็นคู่หรือฝูงเล็กๆ หากินและบินไล่กันตามไม้พุ่ม และต้นไม้ มักเกาะบริเวณที่โล่ง อาหารได้แก่ ผลไม้ เช่น ไทรหว่า ชมพู่ มะละกอ มะม่วง ผลตำลึงสุก เป็นต้น นอกจากนี้ยังจิกกินแมลงและตัวหนอนตามลำต้น กิ่งก้าน และยอดไม้
- ผสมพันธุ์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน รังเป็นรูปถ้วย ทำด้วยกิ่งไม้เล็กๆ ทั่วไปไม้ ยึดติดกันด้วยใยแมงมุม รังอยู่ตามพุ่มไม้ ต้นไม้ ไม้เถา รังสูงจากพื้นดิน 2.5 – 4.5 ม. วางไข่ครั้งละ 2 – 3 ฟอง ไข่มีสีเนื้อและมีลายจุดสีน้ำตาลแดงทั่วฟอง ทั้งพ่อและแม่ช่วยกันสร้างรัง ฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะฟักไข่ 12 – 14 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น โดยทั่วไปพบบ่อยและมีปริมาณมากทั่วทุกภาค แต่ในป่าสะแกราชพบไม่บ่อย ปรอดสวนทั่วโลกมี 3 ชนิดย่อย ประเทศไทยพบ 1 ชนิดย่อย คือ *Pycnonotus blanfordi conradi*
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกปรอดสวน

Streak-eared Bulbul

Pycnonotus blanfordi Jerdon, 1862)

Pycnonotidae

Passeriformes