

นกกะลิงเขียด

- ลักษณะ :** ขนาดความยาวลำตัว 43 ซม. สีน้ำตาลเหลืองสดใส ปากสีดำ บริเวณหัว คอ และหน้าอกตอนบนสีออกเทาดำ ปีกสีดำมีลายพาดขนาดใหญ่สีเทาบริเวณขนคลุมขนปีกและขนกลางปีกด้านใน หางยาวและเป็นหางบังมีสีเทา ปลายหางสีดำ
- ที่อยู่อาศัย :** อาศัยอยู่ตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่ารุ่น ในระดับพื้นราบจนถึงความสูง 2,135 ม. (ส่วนใหญ่พบต่ำกว่า 1000 ม.) ในป่าสะแกราชพบบริเวณทุ่งหญ้าผสมป่าเต็งรัง
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดีย เมียนมาร์ ไทย และลาว
- อุปนิสัย :** มักเป็นคู่หรือเป็นฝูงเล็ก ๆ หากินตามกิ่งของต้นไม้ ไม้พุ่ม และบนดิน กินทั้งผลไม้ หนอน แมลง และซากสัตว์เป็นอาหารบางครั้งบินโฉบจับแมลงกลางอากาศ
- ผสมพันธุ์ราวเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ทำรังแบบง่าย ๆ คล้ายรังกาเป็นรูปถ้วยตื้น ๆ ใช้กิ่งไม้เล็ก ๆ จากไม้ วางซ้อนกันและขัดสานกัน อาจรองรังด้วยใบไม้ และรากไม้เล็ก ๆ รังอยู่ตามง่ามไม้ที่ติดกับลำต้นสูง 6 - 8 ม. วางไข่ครั้งละ 2 - 3 ฟองไข่มีสีแดงซีด มีลายสีน้ำตาลแกมแดง และสีเทาแกมดำ โดยเฉพาะด้านบนของไข่ ทั้งสองเพศช่วยกันทำรัง ฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะเวลาฟักไข่ 15 - 16 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกกะลิงเขียด

(ชื่ออื่น : นกกะลิงหัวดำ)

Rufous Treepie

Dendrocitta vagabunda (Latham, 1790)

Corvidae

Passeriformes