

อีกา

- ลักษณะ :** เป็นนกค่อนข้างใหญ่ ขนาดลำตัวยาว 51 ซม. ขนสีดำเป็นมัน ปากใหญ่ ตาสีดำ แข็งและเท้าสีดำ
- เขตแพร่กระจาย :** พบในอิหร่านตะวันออกจนถึงประเทศจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาะไหหลำ ได้หวัน หมูเกาะอันดามัน หมูเกาะซุนดา และฟิลิปปินส์
- ที่อยู่อาศัย :** ตามทุ่งโล่ง ป่าโปร่ง ป่าชายเลน และในเมือง จากที่ราบไปจนถึงระดับความสูง 1000 ม. ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** พบโดดเดี่ยว เป็นคู่ หรือเป็นฝูงเล็ก ๆ อาศัยและหากินใกล้บ้านเรือนคน เป็นนกที่ออกหากินตั้งแต่เช้าตรู่ และกลับรังหรือแหล่งอาศัยช่วงเย็นค่ำ เป็นนักสะสม โดยนำอาหารที่หาได้มาซ่อนตามหลืบโพรงของต้นไม้และสิ่งก่อสร้าง บางครั้งขุดดินฝังไว้ และชอบขโมยไข่, ลูกนก ขณะที่แม่นกออกจากรัง อีกากินทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นข้าวสุก ผลไม้ แมลง ตัวหนอน ไข่ ลูกนก กบและเขียด กิ้งก่า แย้ และซากสัตว์ เป็นนกที่มีสายตาดีมากชนิดหนึ่ง
- ผสมพันธุ์ทำรังวางไข่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน ทำรังตามง่ามไม้ รังเป็นแบบง่าย ๆ ใช้กิ่งไม้มาวางซ้อนกัน ตรงกลางเป็นแอ่ง รองพื้นด้วยขนนกหรือวัสดุที่อ่อนนุ่ม วางไข่ครั้งละ 3 - 5 ฟอง ไข่สีเขียวแกมน้ำเงิน มีลายขีดสีน้ำตาล พ่อแม่นกช่วยกันทำรัง วางไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะฟักไข่ 17 - 19 วัน อีกาเป็นนกที่ลูกนกกว่าวางไข่ และให้ฟักไข่แทนมากที่สุด
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ *Corvus macrorhynchos leuallantii*
กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



อีกา

(ชื่ออื่น : กา)

Large-billed Crow, Jungle Crow

Corvus macrorhynchos Wagler, 1827

Corvidae

Passeriformes