

นกกินแมลงป่าฝน

ลักษณะ : เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 17 ซม. ปากหนา หางค่อนข้างสั้น อ้วนป้อมกว่านกกินแมลงอื่น ๆ ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแกมเขียว ใบหน้าและคิ้วสีเทา ใต้คอสีขาว ออกและท้องสีเหลือง สีข้างและขนคลุมโคนหางด้านล่างออกสีน้ำตาล ขาสีเทา

เขตแพร่กระจาย : ตั้งแต่เนปาลจนถึงอัลสัม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาะสุมาตราและบอร์เนียว

ที่อยู่อาศัย : พบอาศัยตามป่าดงดิบ ป่ารุ่น จากที่ราบจนถึงระดับสูง 900 ม. ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าดิบแล้ง

อุปนิสัย : พบหากินโดดเดี่ยว หรือเป็นคู่ หากินตามพุ่มไม้ หรือตามไม้พื้นล่างระดับเกือบติดพื้นดิน อาหาร ได้แก่ แมลง หนอนแมลง และไข่แมลง

ผสมพันธุ์ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ทำรังอยู่ตามง่ามไม้หรือกิ่งไม้ของไม้พุ่ม หรือกอหญ้า สูงจากพื้นราวประมาณ 0.5 – 1.8 ม. รังเป็นรูปถ้วย ทำด้วยต้นหญ้า ใบไม้แห้ง และมอส วางไข่ครั้งละ 3 – 5 ฟอง ไข่มีสีชมพู มีลายสีแดง พ่อแม่ช่วยกันทำรัง ฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน

รังกินแมลงป่าฝนมักถูกนกคัคคูสีม่วงแอบมาวางไข่ ให้เจ้าของรังฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อนแทน

สถานภาพ : เป็นนกประจำถิ่น พบน้อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ *Trichastoma abbotti williamsoni*

กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกกินแมลงป่าฝน

(ชื่ออื่น : นกกินแมลงป่าดิบ)

Abbott's Babbler, Abbott's Jungle Babbler

Trichastoma abbotti Blyth, 1845.

Timaliidae

Passeriformes