

## นกเขนน้อยไชบีเรีย

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็กมาก ลำตัวยาว 15 ซม. หางค่อนข้างสั้น ตัวผู้ด้านบนลำตัวสีน้ำเงินเข้ม ลำตัวด้านล่างสีขาว มีลายแถบสีดำจากโคนปาก ไปยังด้านข้างของอก ตัวเมีย ลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลแกมเขียว คอสีเนื้อ อกสีเหลือง มีลายเก็ดสีน้ำตาล ท้องและขนคลุมโคนหางด้านล่างสีขาว ส่วนตะโพก ขนคลุมโคนหางด้านบน และหางมีสีน้ำเงิน ตัวผู้ไม่เต็มวัย ลักษณะคล้ายตัวเมีย แต่ลำตัวด้านบนมีสีน้ำเงินทึบ ๆ ส่วนตัวเมียที่ยังไม่โตเต็มวัยเหมือนตัวเมียแต่ไม่มีสีน้ำเงินที่ตะโพกและหาง ตะโพกและหางเป็นสีน้ำตาล
- เขตแพร่กระจาย :** เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ อินเดีย จีนตอนใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาะสุมาตรา และเกาะบอร์เนียว
- ที่อยู่อาศัย :** พบทั้งป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่ ป่ารุ่นที่ค่อนข้างชุ่มชื้นและหนาแน่น ส่วนใหญ่พบที่ระดับพื้นราบและเชิงเขา แต่ก็พบได้ในความสูง 1500 ม. ในป่าสะแกราช พบได้ทั้งในป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** พบหากินโดดเดี่ยว เป็นคู่ หรือเป็นฝูงเล็ก ๆ มักหลบซ่อนตามพุ่มไม้ ส่วนใหญ่หากินตามพื้นดิน ด้วยการกระโดดไปมา โดยเฉพาะบริเวณที่รกทึบ อาหารได้แก่แมลงและหนอนแมลง เมื่อตกใจจะกระดกหางอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
- ไม่มีรายงานการทำรังวางไข่ในประเทศไทย
- สถานภาพ :** เป็นนกอพยพย้ายถิ่นมาช่วงฤดูหนาว และบางส่วนเป็นนกอพยพผ่าน พบน้อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ *Luscinia cyane cyane*
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกเขนน้อยไซบีเรีย

**Siberian Blue Robin**

*Luscinia cyane* (Pallas, 1776)

Turdidae

Passeriformes