

นกกะเบื่องผา

- ลักษณะ:** ลำตัวค่อนข้างตั้งตรง มีความยาวจากปลายปากถึงปลายหาง 23 ซม. ทั้งสองเพศมีสีขนแตกต่างกัน นกตัวผู้มีสีขนสวยกว่า มีขนทั่วทั้งตัวเป็นสีน้ำตาลเงินเข้ม เส้นขนแต่ละเส้นมีขอบขาว จึงทำให้เห็นเป็นลายเกล็ดทั่วทั้งตัว นกกะเบื่องผาชนิดย่อย *Monticola solitarius philippensis* ตัวผู้บริเวณอกส่วนล่าง ท้อง ขนคลุมใต้โคนหางจะมีสีน้ำตาลแดง ส่วนบนของลำตัว ใต้คอและอกส่วนบนจะมีสีน้ำตาลเงินสดใส ส่วนตัวเมียจะมีขนส่วนบนลำตัวเป็นสีน้ำตาลปนเทาคล้ำ ๆ เส้นขนแต่ละเส้นมีขอบขาว ทำให้เห็นเป็นลายเกล็ด ส่วนขนด้านล่างของลำตัวเป็นสีครีม เส้นขนแต่ละเส้นมีแต้มสีดำ จึงทำให้เห็นเป็นลายทั่วทั้งส่วนล่างของลำตัว
- เขตแพร่กระจาย:** แอฟริกา ยุโรป เอเชีย อินเดีย จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาะไหหลำ ใต้หวัน หมู่เกาะอันดามัน หมู่เกาะนิโคบาร์ เกาะสุมาตรา เกาะบอร์เนียวและฟิลิปปินส์
- ที่อยู่อาศัย:** พบได้ทั่วไป ทั้งทุ่งโล่ง ป่าโปร่ง หน้าป่า เขาหินปูน แม้กระทั่งตามอาคารหรือตึกสูงในเมือง พบตั้งแต่พื้นราบจนถึงระดับความสูง 1600 ม. ในป่าสะแกราช พบบริเวณป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย:** เป็นนกที่ชอบอยู่โดดเดี่ยว อพยพเข้ามาช่วงเดือนตุลาคม มักเกาะโชว์ตัวเด่น ๆ ตามก้อนหิน ชะง่อนหิน ตอไม้หรือยอดไม้แห้ง ทำให้มันมองเห็นเหยื่อได้ง่ายเหยื่อได้แมลง หนอน แมงมุม หอยทาก รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานเล็ก ๆ ที่คลานอยู่ตามพื้นหรือซอกหิน เมื่อพบเหยื่อมันจะบินลงไปคาบเอามากินทันที ชนิดย่อย *madoci* ทำรังวางไข่ทางภาคใต้ของประเทศไทย หลังผสมพันธุ์แล้ว นกตัวเมียจะไปหาทำเลทำรัง ซึ่งได้แก่ ซอกหรือโพรงตามหน้าผาหินรวมทั้งตามตึกสูง นกตัวเมียคาบหญ้าแห้งและมอสไว้ในโพรงในช่องเพื่อให้เป็นรังรูปถ้วย วางไข่ครั้งละ 3-6 ฟอง ไข่มีสีฟ้าจาง ๆ ตัวเมียทำหน้าที่กกไข่แต่เพียงตัวเดียว ตัวผู้จะคอยดูแลและป้องกันอาณาเขตรอบ ๆ รังของมัน ระยะฟักไข่ 12-13 วัน
- สถานภาพ:** เป็นทั้งนกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์และนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ *affinis* และ *philippensis* ซึ่งเป็นนกอพยพที่พบทั่วประเทศ
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกกระเบื้องฟ้า

Blue Rook Thrush.

Monticola solitarius (Linnaeus, 1758)

Turdidae

Passeriformes