

นกกระจัดหัวโลกเหนือ

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็กมาก ความยาวลำตัว 13 ซม. มีหัวสีขาวยาวแกมเหลือง ปีกมีแถบแคบ ๆ 1 – 2 แถบ ไม่เด่นชัด ลำตัวด้านบนสีเขียวเข้ม ลำตัวด้านล่างสีครีมอ่อน ขนคลุมโคนหางด้านล่างสีขาว ในธรรมชาติคล้ายคลึงกับนกกระจัดเขียวคล้ำ (Greenish Warbler) มาก ต่างกันที่เสียงร้อง และนกกระจัดหัวโลกเหนือจะมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ปีกแหลมกว่า และจะงอยปากใหญ่กว่า และปลายปากค่อนข้างสั้นเล็กน้อย
- เขตแพร่กระจาย :** ตอนเหนือของยูเรเชีย อะแลสกา จีน ไต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะอันดามัน หมู่เกาะซุนดา และฟิลิปปินส์
- ที่อยู่อาศัย :** พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ ป่ารุ่น ป่าชายเลน และสวนผลไม้ ส่วนใหญ่พบที่ระดับพื้นราบ แต่มีรายงานพบที่สูงถึง 1800 ม. ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** มักพบโดดเดี่ยว อาศัยและหากินบนต้นไม้ หรือตามพุ่มไม้ระดับสูง อาหารได้แก่แมลง และหนอนแมลง
- การผสมพันธุ์ ไม่มีรายงานทำรังวางไข่ในประเทศไทย
- สถานภาพ :** เป็นนกอพยพย้ายถิ่นมาช่วงฤดูหนาว ในป่าสะแกราชพบไม่บ่อย นกกระจัดหัวโลกเหนือพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ พวกที่พบทางภาคใต้เป็นพวกที่อพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ ส่วนพวกที่พบทางภาคอื่นเป็นนกอพยพผ่าน
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกกะจิตขั้วโลกเหนือ

Arctic Warbler, Arctic Willow Warbler, Arctic Leaf Warbler

Phylloscopus borealis (Blasius, 1853)

Sylviidae

Passeriformes