


นกกระเจิบหญ้าอกเทา

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 12 ซม. ปากค่อนข้างสั้น เรียวเล็ก ส่วนบนของลำตัวตั้งแต่หน้าผาก กระจงหม่อม ท้ายทอย ไปจนถึงหลังตอนบน มีสีเทาออกน้ำตาล ด้านหลังและปีกมีสีน้ำตาลแก่ ใต้คอสีขาว ออกสีเทา ท้องสีเหลือง ขนหางสีน้ำตาล แต่ปลายหางแต่ละเส้นมีสีขาวออกเทา จะแลเห็นได้ชัดถ้ามองดูด้านล่างของหาง ในฤดูผสมพันธุ์สีขนจะสดใสมากกว่า ทั้ง 2 เพศมีลักษณะเหมือนกัน
- เขตแพร่กระจาย :** ปากีสถาน อินเดีย ศรีลังกา เนปาล บังคลาเทศ จีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ เมียนมาร์ ไทย ลาว เขมร เวียดนาม ไทยพบทุกภาคยกเว้นภาคกลางและภาคใต้
- อยู่อาศัย :** ทุ่งหญ้า ป่าละเมาะ ป่าเต็งรัง ป่ารุ่น ป่าไผ่ พื้นที่รกร้าง และพื้นที่เกษตรกรรม จากพื้นราบจนถึงระดับความสูง 1500 ม. ในป่าสะแกราชพบตามดงหญ้าเพ็ก ซึ่งเป็นไม้พื้นล่างในป่าเต็งรัง ดงหญ้าริมถนนและบริเวณป่าปลูก
- อุปนิสัย :** เป็นนกที่ว่องไว ไม่ค่อยเกาะอยู่นิ่ง นอกฤดูผสมพันธุ์ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 5 - 10 ตัว หรือมากกว่านั้น เคลื่อนไหวตลอดเวลา จะกระโดดไปมาภายในพุ่มหญ้าและดงพืชรก ๆ ขณะกระโดดก็ส่งเสียงร้องไปด้วย และยังยกตัวขึ้น ๆ ลง ๆ และกระดกหางขึ้น ๆ ลง ๆ เทียวค้นหาแมลง เช่น มด ดั้ว หนอนแมลง เพื่อกินเป็นอาหาร นอกจากนี้ยังชอบกินน้ำหวานจากดอกไม้ เช่น ดอกจี่ว ดอกทองกวาว และดอกทองหลางอีกด้วยนกชนิดนี้นับไม่แข็งแรงนัก มักบินเตี้ย ๆ เร็ว ๆ ยอดหญ้า ในระยะใกล้ ๆ เท่านั้น
- ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม มักพบเป็นคู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ นกทั้ง 2 เพศ ช่วยกันทำรังไว้ในดงพืชรก ๆ โดยเย็บขอบของใบไม้ใหญ่ ๆ สีเขียวที่ห้อยลงมาให้ติดกันเป็นกรวย วิธีเย็บใบไม้เช่นเดียวกับนกกระเจิบ โดยใช้ปากที่แหลมคมเจาะขอบใบไม้ให้เป็นรู หลาย ๆ รู แล้วหาเส้นใยของพืชมาร้อย เมื่อเย็บใบไม้ให้ติดกันเป็นรูปกรวย แล้วนำหญ้าและใยพืชมาบุรัง รังจะอยู่สูงจากพื้นดินราว 50 – 90 ซม. วางไข่ครั้งละ 3 – 4 ฟอง ไข่อาจมีสีขาว สีฟ้าอ่อนสีชาวมชมพู สีเขียวอมเทา หรือสีเขียวแกมฟ้าก็ได้ บางฟองมีจุดกระด้วย ระยะฟักไข่ 10 – 11 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบชุกชุมมากในป่าสะแกราช
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกระจิบหน้าอกเทา

Grey-breasted Prinia

Prinia hodgsonii Blyth, 1844

Sylviidae

Passeriformes