

นกกระจิบหญ้าสีน้ำตาล

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 18 ซม. ลักษณะคล้ายกระจิบหญ้าสีเขียว แต่มีขนาดใหญ่กว่า หางยาวกว่า มีคิ้วสีน้ำตาลอ่อน แต่ไม่เห็นเด่นชัด บริเวณหัวและหลังมีลายขีดประปราย ปากสีน้ำตาลแกมสีเนื้อ ลำตัวด้านล่างสีเนื้อ ขาสีชมพู ตัวเต็มวัยช่วงฤดูผสมพันธุ์ลำตัวด้านบนมีสีเทามากกว่า ตัวผู้ปากมีสีดำ
- เขตแพร่กระจาย :** จีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ เวียดนาม ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเกาะชวา
- ที่อยู่อาศัย :** พบตามทุ่งหญ้า ป่าโปร่งทั่วไป จากที่ราบจนถึงระดับความสูง 800 ม. ในป่าสะแก ราชพบบริเวณไม้พื้นล่างของป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** ส่วนใหญ่อาศัยและหากินตามไม้พื้นล่าง เกาะส่งเสียงร้องอยู่ตามพงหญ้าหรือพุ่มไม้เตี้ย ๆ และกระดกหางอยู่เสมอ บางครั้งลงมายังพื้นดิน อาหารได้แก่ แมลง และหนอนแมลง
- ผสมพันธุ์ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม รังเป็นรูปกระโจมหรือรูปไข่ มีทางเข้าและออกด้านข้าง รังอยู่ตามพงหญ้า หรือพืชคลุมดินเตี้ย ๆ วางไข่ครั้งละ 4 ฟอง ไข่สีขาวมีลายสีน้ำตาลแดง พ่อแม่ช่วยกันสร้างรัง พักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน บางครั้งมีนกอีรวตักแตนมวางไข่ในรัง โดยให้นกกระจิบหญ้าสีน้ำตาลฟักและเลี้ยงดูลูกอ่อนแทน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ *Prinia polychroa cooki* ซึ่งเป็นชนิดย่อยชนิดเดียวที่พบในประเทศไทย
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกกระจิบหญ้าตีนน้ำตาด

Brown Prinia, Brown Hill Warbler.

Prinia polychroa (Temminck, 1828)

Sylviidae

Passeriformes