

## นกกะจิบคอดำ

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็กมาก ลำตัวยาวเพียง 12 ซม. ลักษณะสีสันทึกล้ำคล้ำคลึงกับนกกะจิบธรรมดา แตกต่างกันว่า นกกะจิบคอดำ บริเวณหน้าผาก และกระหม่อมเป็นสีน้ำตาลแดง ลำตัวด้านบนมีสีเขียวสดใต้โคนหางมีสีเหลืองสด ตัวผู้ บริเวณใต้คอและด้านข้างคอมีปื้นสีดำ ส่วนตัวเมียไม่มี สำหรับนกที่ยังโตไม่เต็มวัยคล้ายตัวเมีย แต่หัวสีเขียว
- เขตแพร่กระจาย :** พบตั้งแต่สิกขิมไปจนถึงจีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาะสุมาตรา เกาะบอร์เนียว และฟิลิปปินส์
- ที่อยู่อาศัย :** พบตามป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าชายเลน ป่าละเมาะที่ค่อนข้างชื้น จากที่ราบจนถึงระดับความสูง 1200 ม. ไม่ค่อยพบในป่าหรือบริเวณที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ซึ่งพบนกกะจิบธรรมดา ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าเต็งรัง.
- อุปนิสัย :** มักพบโดดเดี่ยวหรือเป็นคู่ เกาะตามพุ่มไม้หรือต้นไม้ที่รกทึบ ทำให้เห็นตัวได้ยาก นอกจากได้ยินเสียงร้อง “กริ – ริ – ริ” ซึ่งแตกต่างจากเสียงร้องของนกกะจิบธรรมดาอย่างชัดเจน อาหารได้แก่ แมลง หนอนแมลง และอาจกินน้ำหวานจากดอกไม้ด้วย
- ผสมพันธุ์ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน รังคล้ายคลึงกับรังนกกะจิบธรรมดา แต่ใช้ใบไม้หรือใบพืชใบเดี่ยว โอบเข้าหากัน แล้วเย็บด้วยใยแมงมุม หรือเชื่อมขอบใบให้ติดกันเป็นรูปกระเปาะ ร่องพื้นรังด้วยดอกหญ้าหรือใบไม้แห้ง วางไข่ครั้งละ 3 – 5 ฟอง พ่อแม่ช่วยกันสร้างรัง ฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะฟักไข่ 11 – 13 วัน
- รังของนกกะจิบคอดำ มักถูกนกอีวาบตีแตก และนกคัคคูขนาดเล็กแอบมาวางไข่ ให้ฟักไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อนแทน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ ชนิดย่อย *nitidus* ซึ่งพบทุกภาคของประเทศ.
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกกระจิบคอดำ

**Dark-necked Tailorbird, Black-necked Tailorbird**

*Orthotomus atrogularis* Temminck, 1836.

Sylviidae

Passeriformes