

นกจับแมลงสีน้ำตาล

- ลักษณะ :** เป็นนกกินแมลงขนาดเล็กมาก ลำตัวยาวเพียง 13 ซม. ปากสีดำโคนปากล่างสีเนื้อ วงตาสีขาว ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแกมเทา มีแถบบนปีกสีขาว ลำตัวด้านล่างสีขาว ออกด้านบนมีสีน้ำตาลแกมเทาจาง ๆ ขาสีดำ
- เขตแพร่กระจาย :** เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เทือกเขาหิมาลัย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไต้หวัน หมู่เกาะอันดามัน และหมู่เกาะซุนดาใหญ่
- ที่อยู่อาศัย :** พวกที่เป็นนกอพยพพบตามป่าโปร่ง ชายป่า พื้นที่ที่ถูกแผ้วถางตามสวนผลไม้ และป่าชายเลนจากที่ราบจนถึงระดับความสูง 1,500 ม. บางส่วนที่เป็นนกประจำถิ่นพบตามป่าโปร่ง และป่าดงดิบเขา ความสูงระหว่าง 600 – 1400 ม. ในป่าสะแกราช พบบริเวณป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** พบโดดเดี่ยวหรือเป็นคู่ มักเกาะตามกิ่งล่างของต้นไม้หรือกิ่งแห้ง จ้องหาเหยื่อ ซึ่งได้แก่แมลง เมื่อพบจะบินโฉบจับด้วยปากกลางอากาศ แล้วกลับมาเกาะที่เดิมและชอบขยับหางหลังจากบินกลับมาเกาะที่เดิมแล้ว มีกิจกรรม มากช่วงเช้าตรู่และเย็นค่ำ
- ชนิดย่อย *siamensis* ซึ่งเป็นนกประจำถิ่นพบทางภาคเหนือของไทย ผสมพันธุ์ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ทำรังตามกิ่งไม้ รังเป็นรูปถ้วย สร้างจากมอสและกิ่งไม้เล็ก ๆ ร่องรังด้วยวัสดุอ่อนนุ่ม เช่น รากฝอย ขนนก วางไข่ครั้งละ 4 ฟอง ไข่มีสีเทาแกมเขียว มีลายสีน้ำตาล ตัวเมียฟักไข่แต่เพียงตัวเดียว โดยตัวผู้จะคอยหาอาหารมาป้อนขณะที่แม่นกฟักไข่ ระยะเวลาฟักไข่ 11 – 12 วัน พ่อแม่นกช่วยกันทำรัง และเลี้ยงดูลูกอ่อน
- สถานภาพ :** เป็นทั้งนกอพยพย้ายถิ่นมาช่วงฤดูหนาว และนกประจำถิ่น ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราชคาดว่าเป็นชนิดย่อย *cinereoalba* ซึ่งเป็นนกอพยพ พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกจับแมลงสีน้ำตาล

Asian Brown Flycatcher, Brown Flycatcher.

Muscicapa daurica Pallas, 1811.

Muscicapidae

Passeriformes