

นกจับแมลงหัวสีเทา

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 13 ซม. บริเวณกระหม่อมมีหงอนขนสั้น ๆ หัว ใต้คอ และอกส่วนบนมีสีเทา ด้านหลังมีสีเหลือง อมเขียว และด้านท้องสีเหลืองสด ไม่พบมีวงขาวรอบตา หรือคิ้วสีขาวเหมือนนกจับแมลงอื่น ๆ
- เขตแพร่กระจาย :** ปากีสถาน อินเดีย จีนตอนใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหมู่เกาะซุนดาใหญ่
- ที่อยู่อาศัย :** ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้งจนถึงป่าดิบเขา ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าเต็งรัง ใกล้เคียงที่ทำการสถานี ฯ
- อุปนิสัย :** เป็นนกที่ค่อนข้างเชื่อง ชอบอยู่ตามบริเวณที่โล่งในป่าริมถนนและตามลำห้วย ในฤดูผสมพันธุ์มักพบเป็นคู่ ๆ ช่วงอื่นอาจพบอยู่โดดเดี่ยว และอาจพบหากินอยู่ร่วมกับนกกินแมลงขนาดเล็กอื่น ๆ อาศัยและหากินตามกิ่งของต้นไม้ระดับต่ำ จนถึงระดับกลางอาหารได้แก่แมลง มักพบไล่จับกินแมลงจากที่เกาะ เป็นนกที่ว่องไว
- ผสมพันธุ์ราวเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ไข่เป็นรูปถ้วยครึ่งซีกประกอบด้วยมอสและไลเคน เชื่อมด้วยใยแมงมุม ไข่ครั้งละ 3 – 4 ฟอง ไข่สีเนื้ออ่อนมีลายดอกดวงหรือลายขีดสีเทา พ่อแม่ช่วยกันทำรัง พักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะฟักไข่ 11 – 12 วัน
- สถานภาพ :** เป็นทั้งนกประจำถิ่น นกอพยพผ่าน และนกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ นกจับแมลงหัวสีเทาที่พบในป่าสะแกราช พบเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนมกราคม คาดว่าน่าจะเป็นนกอพยพ
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกจับแมลงหัวสีเทา

Grey-headed Flycatcher

Culicicapa ceylonensis (Swainson, 1820)

Muscicapidae

Passeriformes