

นกจับแมลงอกส้มท้องขาว

ลักษณะ : เป็นนกขนาดเล็กมาก ลำตัวยาว 15 ซม. ลักษณะคล้ายกับนกจับแมลงคอน้ำตาลแดง (Hill Blue Flycatcher) มาก แตกต่างกันที่นกจับแมลงอกส้มท้องขาว มีสีที่คอและอกสีส้ม หรือสีน้ำตาลแดง แบ่งแยกอย่างชัดเจนกับสีขาวที่ท้อง ลำตัวด้านหลังสีน้ำตาล ส่วนตัวเมียด้านหลังสีออกเทาแกมน้ำตาล คอและอกสีส้ม หางสีฟ้าแกมเทา

เขตแพร่กระจาย : อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเกาะสุมาตรา

ที่อยู่อาศัย : อาศัยตามป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่ ป่ารุ่ม และป่าดงดิบ จากที่ราบจนถึงระดับความสูง 600 ม. ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าดิบแล้ง

อุปนิสัย : มักพบโดดเดี่ยวหรือเป็นคู่ บางครั้งพบหากินร่วมกับนกกินแมลงขนาดเล็ก อื่น ๆ หากินในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินมากนัก อาหารได้แก่ แมลง หนอนแมลง โดยการโฉบจับกลางอากาศใกล้ที่เกาะ หรืออาจจิกกินแมลงตามพื้นดินด้วย

ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน รังเป็นรูปถ้วย ทำรังด้วยมอส หญ้าแห้งและใบไม้แห้ง ร่องรังด้วยรากฝอยละเอียด ทำรังตามตลิ่ง ซอกหิน โขงไม้ ตอไม้ เป็นต้น วางไข่ครั้งละ 3 – 5 ฟอง ไข่สีฟ้าหรือสีน้ำตาลอ่อน มีลายสีน้ำตาลแดง พ่อแม่ช่วยกันทำรัง ฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน

สถานภาพ : เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ ชนิดย่อย *indochina* ซึ่งพบทั่วทุกภาคในประเทศ ยกเว้นภาคใต้

กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกจับแมลงอกส้มท้องขาว

Tickell's Blue Flycatcher, Red-breasted Blue Flycatcher, Tickell's Niltava

Cyornis tickelliae Blyth, 1843

Muscicapidae

Passeriformes