

นกกระจอกตา

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 15 ซม. คล้ายนกกระจอกบ้าน รูปร่างกะทัดรัด จะงอยปากสั้นคล้ายรูปกรวย หางสั้นและปลายหางเว้า ตัวผู้และตัวเมียมีสีสันแตกต่างกัน ตัวผู้ กระจงหม่อม หลังคอค และตะโพกมีสีเขียวแกมเทา หลังช่วงบน ขนคลุมไหล่และแถบหลังตามีสีน้ำตาลแดง แก้มและลำตัวด้านล่างมีสีเหลืองอ่อน ใต้คอมีสีดำ ตัวเมีย ลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลอ่อนแกมเทา ลำตัวด้านล่างสีเหลืองจางๆ มีควี่สีเหลือง
- เขตแพร่กระจาย :** เป็นนกที่พบเฉพาะถิ่น ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ที่อยู่อาศัย** อาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง พื้นที่เกษตรกรรม และตามชานเมือง จากที่ราบจนถึงระดับความสูง 800 ม. ในป่าสะแกราชพบบริเวณไร่ข้าวโพดติดกับทุ่งหญ้าผสมป่าปลูก ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่ป่าสะแกราช
- อุปนิสัย :** มักอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ บางครั้งพบเป็นฝูงใหญ่ขึ้นร้อยตัว หากินตามพื้นดิน สนามหญ้า นาข้าว และในกอไม้ อาหารได้แก่เมล็ดข้าว เมล็ดพืชต่าง ๆ รวมทั้งเมล็ดไม้และเมล็ดสนทะเล โดยใช้ปากขบกระเพาะเปลือกออกเพื่อกินเนื้อใน นอกจากนั้นกินแมลงชนิดต่าง ๆ ด้วย หลังหาอาหารพากันบินขึ้นไปเกาะตามต้นไม้สูง ๆ มักอยู่ในร่มเงาของใบไม้หนาทึบ ทำให้เห็นตัวได้ยาก นอกจากได้ยินเสียงร้อง “ซีพ ซีพ ซีพ”
- ผสมพันธุ์ ทำรัง วางไข่ได้เกือบตลอดทั้งปี แต่ส่วนใหญ่จะทำรังต้นฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม ทำรังรูปโดมด้วยใบหญ้าแห้งชุกไว้ตามง่ามไม้บนต้นไม้ หรือชุกไว้ตรงคอต้นตาลบริเวณโคนก้านใบ หรืออาจเข้ามาทำรังตามรอยแยกของอาคาร วางไข่ครั้งละ 2 – 4 ฟอง ไข่มีสีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อน คล้ายไข่นกกระจอกบ้าน พ่อแม่จะผลัดกันกกไข่จนลูกนกฟักออกจากไข่ ระยะฟักไข่ 11 – 12 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช
- กฎหมายยังไม่จัดเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกกระจอกตา

Plain-backed Sparrow, Pegu House Sparrow, Pegu Sparrow

Passer flaveolus Blyth, 1844.

Passeridae

Passeriformes