

๗ นกกระติ๊ดตะโพกขาว

- ลักษณะ :** ลำตัวยาว 11 ซม. หัว หลัง ปีก คาง คอ หาง และอก สีน้ำตาลเข้มมีลายขีดสีขาวอยู่ทั่วไป ท้องขาว ตะโพกสีขาว ขนคลุมใต้โคนหางสีน้ำตาลอ่อน
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดีย หมู่เกาะอันดามัน หมู่เกาะนิโคบาร์ จีนตอนใต้ ไทหล่า ได้หวัน สุมาตรา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นสิงคโปร์
- ที่อยู่อาศัย :** อยู่ตามไม้พื้นล่าง ในป่าโปร่ง ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง สวนผลไม้ ทุ่งหญ้า
- อุปนิสัย :** อาศัยรวมกันอยู่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ตามทุ่งหญ้า นาข้าว ทุ่งไม้เล็ก ๆ ริมหาดเลน ตามไม้พื้นล่างในป่าโปร่ง หากินอยู่ตามพื้นดินหรือตามต้นหญ้า กินเมล็ดหญ้า เมล็ดพืช ทุ่งไม้สูงและแมลง นอนรวมกันกับนกกระติ๊ดชนิดอื่น ตามดงหญ้า ไร่อ้อย
- ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม วางไข่ครั้งละ 3-5 ฟอง ระยะเวลาฟักไข่ 13-14 วัน
- สถานภาพ :** นกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกระตีตตะโปกขาว

White-rumped Munia

Lonchura striata (Linnaeus, 1766)

Estrildidae

Passeriformes