




ตัวเต็มวัย



ลูกอ๊อด

ปาดจ๊วข้างขาว ปาดจ๊วป่าตะวันออก *Chiromantis*
hansenae (Cochran, 1927)
 Hansen's bush frog

ปาดจีวตะวันออก ปาดจีวข้างขาว – *Chiromantis hansenae* (Cochran, 1927)

ลักษณะ มีขนาดตัวเล็ก (จากปลายปากถึงรูกันประมาณ 20 มิลลิเมตร) ลำตัวยาว ผิวหนังลำตัวด้านหลังเรียบ แต่ได้คาง ด้านท้อง และด้านในของต้นขาหลังมีตุ่มละเอียดกระจาย

ด้านหลังสีน้ำตาลอมม่วงและมีเส้นสีครีมจากพาดยาวตรงกลางของหลังจากบริเวณท้ายทอยไปที่รูกัน บนหัวระหว่างตาทั้งสองข้างมีแถบสีเข้มพาดขวาง แต่ไม่ชัดเจน ขอบด้านนอกของด้านหลังมีแถบสีขาวพาดยาวจากส่วนปลายของปากผ่านด้านบนของตาและไปสิ้นสุดบริเวณขานี้บ แถบสีขาวที่อยู่ทางด้านหน้าของตาเป็นเส้นแคบและขยายกว้างขึ้นตามลำดับจากทางด้านท้ายตาไปที่ขานี้บ ด้านข้างลำตัวสีน้ำตาลอมเขียว ด้านท้องสีขาว

ขาน้ำสั้นแต่ขาหลังค่อนข้างยาว เมื่อพับขาหลังแนบกับลำตัวไปทางด้านหน้า ข้อตีนอยู่ในตำแหน่งลำด้านหน้าของตาไปเล็กน้อย นิ้วตีนหน้ามีแผ่นหนังเล็กมากอยู่ที่โคนนิ้ว นิ้วตีนหลังมีแผ่นหนังประมาณ $\frac{3}{4}$ ของความยาวนิ้ว ส่วนปลายของนิ้วทุกนิ้วขยายเป็นตุ่มใหญ่

การแพร่กระจาย กัมพูชา ในประเทศไทยพบเฉพาะภาคตะวันออกและบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ต่อเนื่องกับภาคตะวันออก ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชพบบริเวณลำห้วยของถ้ำจาง

พื้นที่อาศัย ใกล้เคียงลำห้วยน้ำไหลที่มีกลุ่มไม้หรือพรรณพืชปกคลุมชายฝั่ง

นิสัย พบเห็นตัวเฉพาะฤดูฝนในเวลากลางคืนและพบได้น้อยครั้ง เกาะอยู่บนกิ่งของต้นไม้ที่เติบโตอยู่ข้างลำห้วย

ไม่มีข้อมูลการผสมพันธุ์และวางไข่ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช แต่การศึกษาของ โกวิท น้อยโคตร (2545) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ อธิบายว่า ผสมพันธุ์และวางไข่ในฤดูฝน วางไข่ในก้อนฟอง (ก้อนฟองโปร่งใสและมองเห็นไข่ชัดเจน) ติดไว้กับใบไม้และเพศเมียมีพฤติกรรมเฝ้าไข่ ลูกอ๊อดมีขนาดตัวเล็ก หัวและลำตัวกว้างและป้อม ลำตัวสีน้ำตาลอมเทา มีแถบสีดำยาวพาดจากปลายปากผ่านตาและยาวต่อเนื่องไปถึงปลายหาง บนหลังมีปื้นสีดำกระจาย ครีบท้องมีจุดสีดำกระจาย หางยาว ส่วนโคนหางใหญ่และส่วนปลายหางเรียว ครีบท้องกว้าง ครีบท้องบนใหญ่กว่าครีบท้องล่าง ปากอยู่ทางด้านล่างค่อนข้างไปทางด้านหน้าของหัว ช่องปากใหญ่ ตุ่มฟันในอุ้งปากมีจำนวนแถวและลักษณะการเรียงตัวเป็นสูตร $I:3+3/1+1:II$ จะงอยปากสั้นแต่กว้าง ขอบของจะงอยปากมีรอยหยักทั้งจะงอยปากบนและจะงอยปากล่าง ลูกอ๊อดจะหลบซ่อนตัวอยู่ใต้ซากใบไม้หรืออยู่ตามพื้นที่ชื้นน้ำ

ลูกอ๊อดปาดจีวตะวันออกกับลูกอ๊อดปาดจีวสีม่วงมีขนาดตัวใกล้เคียงกันและมีลักษณะโครงสร้างในอุ้งปากคล้ายคลึงกัน แต่ โกวิท น้อยโคตร (2545) อธิบายความแตกต่างของลูกอ๊อดปาดจีวสองชนิดนี้ว่า ลูกอ๊อดปาดจีวตะวันออกมีลำตัวสีน้ำตาลอมเทา แผ่นครีบท้องบน

และแผ่นครีบท่างมีจุดเริ่มต้นที่ส่วนท้ายของลำตัว และแผ่นครีบท่างทั้งสองส่วนมีจุดหรือปื้นสีเข้มกระจายอยู่ แต่ลูกอีอดปาดจิ๋วสีม่วงมีลำตัวสีน้ำตาลเหลือง แผ่นครีบท่างบนและแผ่นครีบท่างล่างมีจุดเริ่มต้นก่อนหน้าส่วนท้ายสุดของลำตัว และมียจุดหรือปื้นสีเข้มกระจายอยู่เฉพาะแผ่นครีบท่างบน ส่วนแผ่นครีบท่างล่างโปร่งใส

สถานภาพ ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535 และไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามกฎหมายของ Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2005) และตามกฎหมายของ IUCN (2008)