

กระถินพิมาน



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Acacia harmandiana* (Pierre) Gagnep.

ชื่อพื้นเมือง หนามพิมาน (นครราชสีมา) ; กระถินป่า, กระถินพิมาน (พิษณุโลก, สุโขทัย); แฉลบขาว (ราชบุรี); ปีมาน (ภาคเหนือ); พิมาน, มะขี้มาน (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE – MIMOSOIDEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น กระถินพิมานเป็นไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 10 – 15 เมตร เปลือกต้น สีขาวแกมเทา เปลือกด้านในสีแดงอมน้ำตาล ต้นและกิ่งมีหนามแหลม

ใบ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ ใบย่อยรูปขอบขนาน ปลายมน โคนเบี้ยว

ดอก ดอกออกเป็นช่อกระจุกแน่น ตามปลายกิ่ง ก้านช่อดอกมีขนเล็กน้อย ดอกสีขาวมีจำนวนมาก เรียงชิดกันแน่นบนก้านช่อดอก ออกดอกเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

ฝัก ฝักแบนยาวแคบ รูปขอบขนาน ฝักแก่สีน้ำตาล โกงงอ เมล็ดรูปไข่ ออกผลเดือนกรกฎาคม – กันยายน

แหล่งที่พบ พบขึ้นในป่าเต็งรังที่โล่งแจ้ง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดจัด ขึ้นได้ดีในดินแทบทุกสภาพ

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ฤดูฝน

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ใบอ่อน ยอดอ่อน รับประทานเป็นผักสดกับน้ำพริก ลาบ รวมกับผักอื่น ๆ

รส จืด มัน

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด