


กล้วยเต่า



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Polyalthia debilis* (Pierre) Finet & Gagnep.

ชื่อพื้นเมือง ตับเต่า, ตับเต่าน้อย (นครราชสีมา, ภาคเหนือ); กล้วยตับเต่า, กล้วยเต่า (ราชบุรี); ไช้เต่า (เชียงใหม่)

ชื่อวงศ์ ANNONACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น กล้วยเต่าเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 30 – 50 เซนติเมตร แตกกิ่งจำนวนมาก ในระดับพื้นดิน กิ่งอ่อนมีขนอ่อนนุ่มหนาแน่น กิ่งสีน้ำตาล

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน หลังใบสีเขียวเข้มเป็นมันท้องใบสีจางกว่าและมีขน เส้นแขนงใบ 7 – 10 คู่

ดอก ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ สีเหลือง กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยม กลีบดอกหนาเรียงเป็น 2 ชั้น ออกดอกเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม

ผล ผลเป็นผลกลุ่ม อยู่บนแกนดัดกลม ผลย่อยรูปทรงกระบอก มีรอยคอดระหว่างเมล็ด ผลอ่อนสีเขียว เมื่อสุกสีน้ำตาล เมล็ดแบนกลมสีน้ำตาล 1 ผล มี 1 – 3 เมล็ด ออกผลเดือนกันยายน – ตุลาคม

แหล่งที่พบ พบในป่าเต็งรัง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดจัด ขึ้นได้ดีในดินร่วน ไม่อุ้มน้ำ

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ฤดูฝน

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ผลสุก เนื้อหุ้มเมล็ดรับประทานได้

รส หวาน

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด