

ก่อนนก



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Lithocarpus polystachyus* (A.DC.) Rehder

ชื่อพื้นเมือง ก่อขี้หมู (นครราชสีมา); ก่อแงะ, ก่อหมาก, ก่อเอี้ยก (เชียงใหม่);
ก่อนนก, ก่อหัวหมู (เชียงราย)

ชื่อวงศ์ FAGACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ก่อนนกเป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10 – 25 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม
แตกเป็นร่องตามยาว เปลือกหนา

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอก ปลายแหลมสอบ โคนใบป้าน ขอบใบเรียบ
ใบแก่สีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านท้องใบสีเงินและมีเกล็ดเล็ก ๆ เส้นแขนงใบ
8 – 12 คู่ ก้านใบเรียวเล็ก

ดอก ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อแบบหางกระรอก ออกตามซอกใบ
หรือปลายกิ่ง สีขาวหรือเหลืองอ่อน ออกดอกเดือนกรกฎาคม – กันยายน

ผล ผลกลมรูปรี เปลือกผลหนา มีหนามสั้น ๆ เปลือกของผลชั้นในสีน้ำตาล
เนื้อในเมล็ดสีขาว ออกผลเดือนสิงหาคม – ธันวาคม

แหล่งที่พบ พบในป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดจัด ขึ้นได้ดีในดินร่วนปนทราย

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ฤดูฝน

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร เนื้อในเมล็ด ต้มให้สุกรับประทานได้

รส มัน

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด