

# พลับพลา



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Microcos tomentosa* Sm.

ชื่อพื้นเมือง ค่อมส้ม, พลับพลา (นครราชสีมา) กะปุกกะปู, ค่อม, พลา, ลาย, สากกะเบือตง, สากกะเบือละว้า, หมากหอม (ภาคเหนือ); ก่อมส้ม, ค่อมส้ม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); ค่อมเกลี้ยง, พลองส้ม (ภาคตะวันออก); มลาย (ภาคตะวันออกเฉียงใต้); ขี้เถ้า, พลับพลา (ภาคกลาง); จับมือแก (มลายู, ภาคใต้); น้ำลายควาย, พลาขาว, พลาลาย (ภาคใต้)

ชื่อวงศ์ TILIACEAE

## ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

**ต้น** พลับพลาเป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10 – 20 เมตร ผลัดใบ เปลือกต้นสีเทา แตกล่อนเป็นสะเก็ดบาง ๆ เปลือกในสีชมพู มีเส้นใยเรียงตัวเป็นชั้น ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กลับ ปลายใบเป็นติ่งแหลมสั้น ๆ โคนใบมน ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อยจนถึงเรียบ ผิวใบมีขนปกคลุมทั้งสองด้าน

**ดอก** ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่งหรือซอกใบ ดอกตูม รูปกลม กลีบเลี้ยงกลีบ 5 กลีบ ดอก 5 กลีบ สีเหลืองอ่อน ดอกในช่อมีจำนวนมาก ออกดอกเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

**ผล** ผลรูปทรงกลมแกมไข่กลับ เมล็ดแข็ง ผลสุกสีม่วงดำ ออกผลเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน

**แหล่งที่พบ** ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าคืนสภาพ

**สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม** ชอบแสงแดดจัด ขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิด

**ฤดูกาลใช้ประโยชน์** ฤดูหนาว

**ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร** ผลสุกรับประทานได้

**รส** หวาน

**การขยายพันธุ์** เพาะเมล็ด